

QK

1

P56

v. 1

1803

QK

1

P56

v. 1

1803

QK  
1  
P56  
V.1  
1803

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY



3 1924 069 210 098



*New York  
State College of Agriculture  
At Cornell University  
Ithaca, N. Y.*

---

*Library*


.....

DATE DUE

INTERLIBRARY LOAN

GAYLORD

PRINTED IN U.S.A.



Phytophographische  
B L Ä T T E R.

---

Verfaßt

von

einer Gesellschaft Gelehrten

und herausgegeben

von

D. G. F. Hoffmann

Öffentlichem ordentlichem Lehrer der Arzneykunde und  
Botanik zu Göttingen.



---

Erster Jahrgang 1803.

---

Göttingen  
im Verlage bey P. G. Schröder.

@  
QK1  
P56  
V. 1  
1803

@ 69226

## V o r r e d e .

Der Plan zu Errichtung einer literarischen Verbindung, welche allein die Aufnahme und Verbreitung der wissenschaftlichen Pflanzenkunde zum Endzweck hat \*), ist gleich Anfangs mit so vieler Theilnahme unterstützt worden, daß gegenwärtige Phytographische Blätter herausgegeben werden konnten; zu deren weitem Fortsetzung die folgende Anzeige der Mitglieder keiner weitem Verbürgung bedarf.

\*) Societas Phytographica Göttingensis incrementa rei herbariae studio aliquo praecipuo petsequeitur, eo consilio, ut, quicquid singulorum Sodalium doctrina et ingenio indagatum et detectum fuerit, in rei herbariae usus etiam vulgetur, adeoque his plantarum copiis opibusque, quae communi usu habentur, accessio nova et auctus fiat.

Ver.

A. Dufz. # 2.50 S. 315. Bot. C. F. 25. 82



---

Verzeichniss  
der  
Ehren - Mitglieder.

---

- Herr Staatsrath und Baron von *Asch* zu Peters-  
burg.
- Hofrath *Blumenbach* zu Göttingen.
  - Geh. Rath und Freyherr von *Goethe* zu  
Weimar.
  - Bergrath und Professor Edler von *Jacquin*  
zu Wien.
  - Präsident und geheimer Hofrath von *Schre-  
ber* zu Erlangen.
  - Präsident *Smith* zu Norwich.
  - Ritter *Thunberg* zu Upsal.
  - Ritter und Kammerherr Graf von *Wald-  
stein* zu Wien.
  - Obercommissarius *Westfeld* zu Weende.
- 

Ver-

v

---

Verzeichnifs  
der  
ordentlichen oder activen Mitglieder.

---

Herr *E. Acharius*, M. D. Provinzialmedicus zu Ostgothland in Schweden.

- *H. Andrews*, zu London, Verfasser der *Ericar. icon.* und des *Botanist's Repository*.
- *S. E. Bridel*, Rath zu Gotha.
- *F. A. von Braune*, Hofkammerrath zu Salzburg.
- *A. J. Cavanilles*, Professor und Director des botanischen Gartens zu Madrit.
- *Delavigne* M. D. aus Amiens, Verfasser einer *Flore germanique* und einer französischen vermehrten Ausgabe von Schkuhr's *Monographie über die Carices*.
- *H. G. Gärtner* Botanicus zu Hanau und Mit-herausgeber der *Wetteraufischen Flora*.

Herr

Herr *C. C. Gmelin* M. D. Hofrath und Professor der Naturgeschichte und Botanik zu Carlsruh.

— *J. F. Gmelin* M. D. Hofrath und Professor der Chemie zu Göttingen.

— *G. F. Hayne*, zu Schönebek bei Magdeburg. Verf. der *Termini botanici*.

— *H. A. Hedwig*, M. D. Professor der Botanik zu Leipzig.

— *D. H. Hoppe*, M. D. zu Regensburg.

— *N. T. Host*, M. D. Professor der Botanik am Theresiano zu Wien.

— *F. Kitaibel*, M. D. Professor der Chemie und Botanik zu Pésth in Ungarn.

— *K. König*, M. D. zweiter Bibliothecar des Ritter und geh. Rath *Banks* zu London.

— *S. Liljeblad* der Oekonomie Adjunctus zu Upsal, Verf. der *Utkast til en Svensk Flora etc.* (Upsal 1798. 8.)

— *H. F. Link*, M. D. Professor der Physik Chemie und Botanik zu Rostock.

— *G. F. Mertens*, Professor zu Bremen, Verf. mehrerer Beobachtungen über die Conferven und Seegewächse.

Herr

Herr *B. Meyer*, M. D. Physicus zu Offenbach am Main, Verf. der oekonomisch-technischen Flora der Wetterau.

— *C. Moench*, M. D. Hofrath und Professor der Chemie und Botanik zu Marburg.

— *H. Mühlenberg*, S. S. T. D. zu Lancaster in Pensylvanien, Verf. der Flora Lancastriensis (Trans. of the Americ. Soc. V. 3. 1793).

— *C. H. Persoon*, D. vom Vorgebürge der guten Hoffnung, gegenwärtig zu Paris.

— *G. W. F. Panzer*, M. D. Physicus zu Lauf in Franken.

— *J. F. Pott*, M. D. Herzoglich - Braunschweigischer - Leibarzt.

— *A. J. Retzius*, P. M. Professor der Naturgeschichte und Oekonomie zu Lund in Schweden.

— *A. G. Roth*, M. D. Physicus in den Herzogthümern Bremen und Verden.

— *J. J. Roemer*, M. D. Professor der Medizin und Botanik in Zürich.

— *J. Scherbius*, M. D. Physicus in Frankfurth am Main, Mitherausgeber der wetterauischen Flora.

— *C. Schkuhr*, Universitäts - Mechanikus zu Wittenberg.

Herr

# VIII

Herr *J. C. Schleicher*, M. D. Apotheker zu Bex  
im Canton Lehman.

- *P. K. A. Schousboe*, dänischer Consul zu Marokko, Verf. der Beobachtungen über das Gewächsreich in Marokko.
- *C. F. Schumacher*, dritter Professor bey der chirurgischen Akademie zu Kopenhagen, Verf. der Enum. plantar. in part. Saellandiae sept. et orient. (Hafn. 1801).
- *B. Smith Barton*, M. D. Professor der Naturgeschichte und Botanik zu Philadelphia.
- *J. Sowerby*, zu London, Verfasser und Herausgeber der English Botany.
- *O. Swartz*, M. D. Professor der Naturgeschichte am bergianischen Institut zu Stockholm.
- *F. Schwaegrichen*, M. D. Privatlehrer der Naturgeschichte und Botanik zu Leipzig.
- *C. Sprengel*, M. D. Professor der Medizin und Botanik zu Halle.
- *F. Stephani*, M. D. Professor der Botanik und Chemie zu Moskau.
- *M. Vahl*, M. D. Professor der Botanik zu Kopenhagen.
- *E. P. Ventenat*, Mitglied des französischen National - Instituts und Bibliothekar bey dem Pantheon.

Herr

Herr *G. F. Wedemeyer* Amtmann zu Eldagsen im  
Hannöverischen, Verf. eines Catal. horti  
proprii.

— *J. C. Wendland*, Gartenmeister zu Herren-  
hausen.

— *C. L. Willdenow*, M. D. Professor der Bo-  
tanik und Naturgeschichte am Collegio me-  
dico-chirurgico zu Berlin.

— *J. F. Wolff*, M. D. zu Schweinfurth, in  
Franken, Verf. der Commentatio de Lemna  
(Altorf. 1801. 4.)

— *F. X. von Wulfen*, Freyherr und Abt zu  
Klagenfurth in Kärnthen.

Ver-

---

Verzeichniss  
der  
ausserordentlichen Mitglieder.

---

- Herr *J. Arndemann* M. D. und Professor.
- *J. Booth* aus London.
  - *Franz und Ernst*, Barone von Crailshaim in Franken.
  - *B. Fiorillo*, Bibliotheks-Secretair zu Göttingen.
  - *C. Freyer*, M. D. aus Westgallitzien.
  - *F. Frommüller*, M. D. zu Fürth in Franken.
  - *J. C. Funk*, Apotheker zu Bayreuth.
  - *F. Hüser*, M. D. Physicus zu Mühlhausen.
  - *D. G. Kieser*, M. D. aus Lüneburg.
  - *J. H. Lackemann*, M. D. zu Hameln.
  - *F. G. Londes*, M. D. Privatlehrer zu Göttingen.
  - *F. Ludwig* zu Meßfersdorf in Oberschlesien.
  - *C. Jannasch* aus Warschau.
  - *G. Naef*, M. D. aus St. Gallen in der Schweiz.
  - *D. Rottler*, Missionarius zu Trankebar.
  - *J. F. Schultz*, Iur. utr. D. zu Bremen.
  - *J. F. von Schwartz*, Herzoglich-Sachsen-Weimarer Major,

Göttingen im März 1803.

*G. F. Hoffmann.*

---

---

I.

**Nouae Species Plantarum Capensium,  
examinatae et descriptae**

*a C. P. Thunberg.*

---

Postquam ante multos abhinc annos Floram meam Capensem manuscriptam Berolini imprimendam transmissi, contigit mihi Plantas Capenses nonnullas alias, interque has, plerasque novas species examinare et describere. Harum fasciculum, quinque priores Systematis Sexualis Classes comprehendentem lubentissime cum Illustri Societate Phytographica communico, ut Actis Eius, si ita visum fuerit, descriptiones inserantur, atque

A

plan



---

plantae, tamquam in Prodromo meo Capensi  
non nominatae, publici iuris fiant.

Ordinem eundem heic fui secutus, quem  
in Prodromo et ipsa Flora adoptavi; scilicet ex-  
clusi Classes *Gynandriae*, *Monoeciae*, *Dioeciae*  
atque *Polygamiae*, atque eas plantas, quae sub  
his in Systemate Linnaeano classibus militarent,  
ad priores retuli. Quantum potui, pro virili stu-  
dii, vt termini sint iusti et absque ambiguitate  
perspicui atque genuini.

Vpsal. die 26. Febr. 1802.

---

---

**IXIA** *radians*: foliis filiformibus, scapo erecto  
vnifloro; corolla bicolori.

*Scapus* iliformis, flexuoso-erectus, simplex et ra-  
mosus, glaber, palmaris vsque spithamaeus;

*Folia* alternatim vaginantia, filiformi-lineararia,  
bisulca, glabra, scapo breuiora.

*Vaginae* inflatae, striatae, glabrae.

*Flos* terminalis, grandis.

*Corolla* bicolor, limbo apice caeruleo, medio arcu  
albido, basi purpurea macula saturatiori.

*Spathae* glabrae, longitudinē tubi.

**IXIA** *bicolor*: foliis ensiformibus, multinerviis;  
reflexis, scapo ramoso; corollis luteis basi  
caeruleis.

*Scapus* filiformis, flexuoso-erectus, glaber; ra-  
mosus, foliis paulo longior, palmaris vel  
spithamaeus.

*Folia* ensiformia, integra, glabra, multinervia,  
reflexa.

*Flores* alterni, vnus vsque quatuor.

*Corollae* limbus totus luteus; *tubus* apice caeru-  
leus, basi flauus.

*Spathae* glabrae.

*IXIA fenestrata*: foliis ensiformibus acutis nervosis glabris, scapo brevioribus, floribus alternis.

*Scapus* simplex, flexuoso-erectus, glaber, pedalis.

*Folia* ensiformia, acuta, integra, glabra, nervosa, scapo duplo breviora, vix vnguem lata.

*Flores* alterni, purpurei, immaculati.

*Limbus* obtusus.

*Spathae* glabrae, tybo paulo breviores.

*Ixia fenestrata*. Jacqu. Rarior. 2. fasc. 10. Tab. 8.

*IXIA squalida*: foliis lineari-lanceolatis glabris, floribus alternis luteis, laciniis limbi excisis, scapo ramoso.

*Scapus* ramosus, flexuoso-erectus, glaber.

*Flores* alterni, sessiles, toti lutei venis fuscis.

*Limbi* lacinae obovatae, obtusae, excisae.

*Spathae* glabrae, apice brunneae.

*IXIA elliptica*: foliis ellipticis glabris, floribus secundis, scapo ramoso.

*Scapus* angulatus, glaber, erectus, ramosus.

Fo.

*Folia* elliptica, basi valde attenuata, dein obovata, acuta, integra, glabra, digitalia, scapo multo breviora.

*Flores* sessiles, plures, secundi, caerulei.

*Rachis* flexuosa.

*BRYONIA cordata*: foliis cordatis scabris denticulatis, floribus axillaribus geminis.

*Caulis* decumbens, filiformis, sulcatus, glaber, simplex.

*Folia* alterna, petiolata, cordata, ovata, acuta, obsolete serrulata, papilloso-scabra imprimis supra, glabra, pollicaria.

*Petiolus* longitudine folii.

*Pedunculi* capillares, axillares, bini, uniflori, folio breviores.

*Baccae* glabrae, magnitudine pisi.

*SCHOENUS aggregatus*: Culmo tereti striato aphylo, spiculis terminali-aggregatis.

*Radix* fibrosa.

*Folia* radicalia plura, culmum inferne vaginantia, filiformia, glabra, erecta, culmo duplo breviora.

*Culmus* filiformis, striatus, glaber, erectus, bipedalis vel ultra.

Ca

*Capitulum* terminale, conglomeratum e spiculis pluribus, sessilibus, brunneis, glabris, semiunguicularibus.

*Involucrum* subdiphyllum, vix capitulo longius.

*Cyperus hirtus*: culmo trigono aphylo, umbella simplici, involucro subtriphylo, foliis filiformibus hirtis.

*Radices* setaceae, plurimae, fasciculatae.

*Folia* radicalia, plurima, lineari-filiformia, pilosa, pollicaria.

*Culmi* plures, capillares, trigoni, erecti, inaequales, longitudine foliorum, vel paulo breviores.

*Umbellae* simplices, circiter sexflorae cum flore centrali sessili.

*Involucrum* 3- vel 4-phyllum.

*Spiculae* ovatae glumis acuminatis.

*Holcus setifolius*: glumis bifloris muticis acutis, foliis filiformi-setaceis.

*Culmus* filiformis, erectus, glaber, simplex, pedalis et ultra.

*Folia* alterna, vaginantia, glabra, inferne filiformia, superne setacea, flexuosa, erecta, culmo breviora.

*Pa-*

*Panicula patens*, floribus glabris.

*RESTIO nutans*: culmo simplici aphylo, spicis oblongis cylindricis cernuis, squamis lacetis acuminatis.

*Culmus* teres, erectus, simplex, aphyllus, bipedalis et ultra.

*Spicae* paniculatae, nutantes, glabrae.

*Spiculae* oblongae, glabrae, vngiculares.

*Squamae* lacerae, acuminatae.

*RESTIO elongatus*: culmo simplici aphylo laeui, spicis alternis erectis ramosis.

*Culmus* teres, simplex, erectus, laevis, aphyllus, quadripedalis.

*Spicae* pedunculatae, ouatae, non inuolucratae.

*Squamae* lacerae, obtusiusculae.

*Differt a R. vaginato*, cui similis:

1. culmo altiori, laeui, nec punctato - rugoso.
2. spicis ramosis, pedunculatis.

*RESTIO bifidus*: culmis simplicibus bifidisque filiformibus aphyllis, spicis erectis.

*Culmi* simplices, raro bifidi, rarius bis bifidi, filiformes, aphylli, erecti, pedales et ultra.

*Spicae* terminales, vnica vel bipae, ouatae, erectae.

*Squamae* ouatae, acuminatae, glabrae.

Re-

**RESTIO cuspidatus:** culmo ramoso folioso tereti, stipulis scariosis, squamis aristatis.

*Culmus* basi decumbens, superne ramosus, flexuoso-erectus, glaber, pedalis.

*Folia* in supremo culmo, trigona, cincta vaginis stipularibus scariosis.

*Spicae* duae vel tres, terminales, ovatae, glabrae.

*Squamae* aristatae.

**RESTIO squamosus:** culmo ramoso tereti, ramis alternis squamosis, spicis globosis erectis.

*Culmus* teres, erectus, ramosus, pedalis et ultra.

*Rami* alterni, similes, subfastigiati.

*Squamae* loco foliorum in culmo et ramis alternae, ovatae, erecto-patulae, brevissimae.

*Spicae* terminales in ramulis, globosae, pismo minores.

*Calycis* squamae trigonae, acutae, glabrae.

**PROTEA villosa:** foliis triternatis filiformibus, capitulis terminalibus globosis hirsutis, caule ramulisque verticillatis hirsutis.

*Caulis* fruticosus, teres, rufescens, hirsutus, erectus, bipedalis et ultra, ramosissimus.

*Ra-*

*Rami et Ramuli* verticillato- proliferi, cauli similes.

*Folia* triternata, imbricata, glabra, vnguicularia. *Pinnæ* filiformes.

*Capitula* terminalia, globosa, magnitudine fabae.

*Squamæ* calycinae subtus hirsutae.

*PROTEA odorata*: foliis lineari- subulatis mucronatis, capitulis terminalibus, calyce glabro.

*Caulis* fruticosus, fuscus, glaber, flexuoso- erectus, ramulosus.

*Rami et Ramuli* trichotomi, cauli similes.

*Folia* lineari- subulata, mucronata, inferne attenuata, integra, glabra, erecta, falcato- incurva, pollicaria et ultra.

*Capitula* terminalia in ramis et ramulis, solitaria, glabra, magnitudine nucis avellanae.

*Calycis* foliola lanceolata, cinerea, glabra,

*PROTEA tenuifolia*: foliis lineari- ellipticis callosis, capitulisque terminalibus globosis glabris,

*Caulis* fruticosus, glaber, purpurascens, erectiusculus, apice ramulosus, pedalis et ultra.

*Rami* in summitate alterni, simplices, rarius ramulosi.

*Folia*



*Folia* linearia, vix apice latiora, integra, glabra, acuta cum callo, curva, vnguicularia.

*Capitula* terminalia, solitaria, globosa, foliis non obvallata, pisi magnitudine.

*Corollae* hirsutae.

*PROTEA virgata*: foliis ellipticis acutis callosis obliquis, capitulis terminalibus subrotundis glabris,

*Caulis* fruticosus, erectus, glaber, ramosissimus.

*Rami* verticillati, elongati.

*Ramuli* superne alterni, virgati.

*Folia* sessilia, sparsa, approximata, elliptica, acuta, callosa, integra, glabra, erecta, pollicaria.

*Capitula* in ramulis terminalia, solitaria, ovata, obtusa, piso maiora.

*Calyx* glaber, *corolla* hirsuta.

*Differt* a *P. parviflora* foliis acutis capitulisque non oblongis, sed globosis et maioribus.

*PROTEA venosa*: foliis ellipticis venosis glabris, glandula mucronatis, capitulo terminali oblongo, bracteis lanceolatis coloratis.

*Protea pallens*. α. Dissert. de Protea.

*Can.*

*Caulis* fruticosus, simplex, erectus, villosus-tomentosus, pedalis et ultra.

*Folia* alterna, sessilia, elliptica, obtusa, glandula terminali mucronata, integra, glabra, venosa, basi subtus et margine inferne villosa, imbricata, bipollicaria.

*Bracteae* lanceolatae, pallidae, capitulo longiores, foliis breviores, glabrae.

*Capitulum* terminale, solitarium, oblongum, cylindricum, bracteis et foliis obvallatum.

**PROTEA rugosa:** foliis ellipticis acutis callosis rugosis glabris, capitulo terminali foliis obvallato, caule calycibusque hirsutis.

*Caulis* fruticosus, simplex, erectus, hirsutus.

*Folia* sessilia, alterna, elliptica, acuta cum callo, integra, glabra, rugosa, imbricata, pollicaria.

*Capitulum* terminale, solitarium, globosum, foliis longioribus vix coloratis obvallatum, nucis auellanae magnitudine.

*Calycis* squamae imprimis apice hirsutae.

**PROTEA pyramidalis:** foliis elliptico-oblongis obtusis callosis, ramis subfastigiatis glabris, capitulis terminalibus globosis glabris.

*Protea pallens.* γ. Dissert. de Protea.

Cau.

*Caulis* fruticosus, erectus, glaber, summo apice ramosus, pedalis et ultra.

*Rami* alterni, simplices, subfastigiati.

*Folia* inferne valde attenuata, obouato-oblonga, obtusa cum callo, integra, glabra, laevia, imbricata, pollicaria.

*Capitula* terminalia, solitaria, globosa, obtusa, glabra, nucis auellanae magnitudine.

*Folia* ramea capitulum obuallantia pallidiora.

*Calycis* squamae ciliatae.

*PROTEA hirsuta*: foliis ellipticis acutis, caule capituloque terminali hirsutis.

*Caulis* fruticosus, totus hirsutus, erectus.

*Rami* alterni, rariores, elongati, simplices.

*Folia* elliptico-linearia, acuta, integra, hirsuta, erecta, vix pollicaria.

*Capitula* terminalia, solitaria, tomentosa, globosa, pyri minoris magnitudine.

*PROTEA verticillata*: foliis lanceolatis calloso-obtusis sericeo-tomentosis, ramis verticillatis.

*Caulis* fruticosus, inferne cinereus, superne sericeo-tomentosus, erectus, ramosus, pedalis et ultra.

*Ra.*

*Rami* per intervalla verticillati, subquaterni, erecti, sericei.

*Folia* in caule decidua, in ramis approximata, imbricata, oblongo-lanceolata, callosa, obtusiuscula, integra, tota argenteo-tomentosa, vix pollicaria.

*Capitula* terminalia, solitaria, globosa, argentea, piso maiora.

*PROTEA macrocephala*: foliis lanceolatis villosis, caule hirsuto, calycis squamis spathulatis ciliatis.

*Caulis* fruticosus, simplex, curvato-erectus, totus valde hirsutus, pedalis et ultra.

*Folia* alterna, sessilia, lanceolata, villosa, apice glabriuscula, integra, imbricata, digitalia.

*Capitulum* terminale, maximum, oblongum, totum hirsutum.

*Calycis* squamae interiores oblongae, spathulatae, obtusae, margine ciliatae: ciliis ferrugineis.

*PROTEA reticulata*: foliis lanceolatis glabris venosis, caule glabro, calycis squamis glabris.

*Caulis* fruticosus, simplex, glaber, erectus, pedalis et ultra.

*Fo-*

*Folia* sparsa, sessilia, lanceolata, callo obtusiusculo, integra, glabra, valde venosa venis eleuatis reticulatis, erecto patentia; digitalia.

*Capitulum* terminale, solitarium, glabrum, pyri magnitudine.

*Calycis* squamæ supremæ margine vix vel parum ciliatæ.

*Corollæ* sericeæ, unguiculares.

*PROTEA scabrida*: foliis lanceolatis marginatis glabris subscabridis, caule glabro, calycis squamis sub apice barbatis.

*Protea speciosa* α Dissert. de Protea.

*Caulis* fruticosus, simplex, erectus, glaber, pedalis et ultra.

*Folia* sparsa, sessilia, lanceolata, integra, fusca nervo medio et margine incrassato luteis, glabra, callis inconspicuis scabrida, imbricata, approximata, sesquidigitalia.

*Capitulum* terminale, solitarium, oblongum.

*Calycis* squamæ inferiores ovatae, interiores oblongae, tomentosae, extus infra apicem nigro-hirsutae, margine barba ferruginea longiori.

PRO.

*PROTEA marginata*: foliis oblongis calloso-acutis marginatis glabris, caule villosa, calycis squamis extus nigro-barbatis.

*Protea speciosa*.  $\beta$ . Dissert. de Protea.

*Caulis* fruticosus, rigidus, hirsutus, simplex, erectus, pedalis et ultra.

*Folia* sparsa, subpetiolata vel basi angustata, oblonga, acuta cum callo, glabra, nervosa: nervo medio et marginali flavescentibus, viridia, erecta, sesquidigitalia.

*Capitulum* terminale, solitarium, oblongum, maximum.

*Squamae* calycinae tomentosae; exteriores ovatae, acutae; interiores lineares, apice dilatato-spathulatae, extus sub apice et margine nigro-barbatae.

*PROTEA obtusata*: foliis lineari-oblongis obtusis glabris, caule decumbente.

*Caulis* fruticosus, teres, pulverulentus, rufescens, decumbens, parum ramosus.

*Folia* sparsa, sessilia, inferne linearia, superne obovata, obtusissima, integra, glabra, rugosa, secunda, pollicaria.

*Florum* capitulum in ramis et apice caulis terminale, tomentosum, magnitudine avellanae.

G.

*GALIUM horridum*: foliis suboctonis linearibus aculeato - serratis reflexis, caule tetragono aculeato suffruticoso.

*Caulis* suffruticosus, erectus, glaber, tetragonus angulis aculeatis, scabridus, parum ramosus, bipedalis et ultra.

*Folia* suboctona, verticillata, linearia, acuta, glabra, marginibus aculeato - serrata, catinata, reflexa, bipollicaria supremis brevioribus.

*Flores* et semina non vidi.

*PENAEA acuta*: floribus terminalibus, corollae laciniis acutis, foliis ovatis acutis.

*Caulis* fruticosus, cinereus, glaber, erectus, ramulosus.

*Rami* et *ramuli* sparsi, filiformes, cauli similes, fastigiati.

*Folia* alterna, sessilia, ovata, acuta, integra, glabra, erecta, subimbricata, lineam longa.

*Flores* terminales, subsessiles, umbellati.

*Tubus* corollae cylindricus, purpurascens, glaber, unguicularis; *lacinae* ovatae, acuminatae.

*Differt* a *P. squamosa*: laciniis corollae non obtusis, sed acutis et tubo longiori, angustiori.

Cvs-

*CUSCUTA africana*: pedunculis unifloris, corollis quinquefidis.

*Cuscuta americana*. Prodrum. Cap. 32.

*Calyx* et *Corolla* quinquefidi.

*Filamenta* 5.

*PARIETARIA lanceolata*: foliis ovato-lanceolatis integris pilosis, caule debili decumbente.

*Radix* fibrosa.

*Caulis* debilis, decumbens, filiformis, striatus, pilosus, inferne parum ramosus, pedalis.

*Rami* oppositi, flexuosi.

*Folia* alterna, petiolata, ovato-lanceolata, integra, nervis imprimis pilosa, inaequalia, unguicularia et ultra.

*Flores* axillares, sessiles.

*BRVNIA comosa*: foliis trigonis glabris patulis, capitulis terminalibus et axillari-sessilibus.

*Caulis* fruticosus, totus glaber, teres, a casu foliorum nodulosus, erectus, ramulosus, tripedalis et ultra.

*Rami* et *Ramuli* verticillati, quaterni et terni, similes, fastigiati.

B

Fo-



*Folia* sparsa, brevissime petiolata, trigona, obtusa apice vstulato, integra, patentia, lineam longa.

*Petioli* folio quadruplo breviores, adpressi, pallidi.

*Capitula* in ramulis terminalia, solitaria et in axillis sessilia, magnitudine pisi.

*Calyx* pallidus.

*Flos* hirsutus lanugine densa.

*BRVNIA phyllicoides*: foliis ovatis convexis imbricatis, capitulis terminalibus hirsutis.

*Caulis* fruticosus, totus tectus foliis, ramulosus, flexuoso-erectus.

*Rami* et *Ramuli* verticillati, villosi, breves.

*Folia* sessilia, ovata, obtusa, crassa, extus convexa, imbricata, villosa, lineam longa.

*Capitula* terminalia, lanata magnitudine pisi.

*PHYLICA glabrata*: foliis lanceolatis subtus tomentosis, capitulis laxatis.

*Caulis* fruticosus, teres, cinereo-fuscus, erectus, vix villosus, ramosus.

*Rami* et *Ramuli* sparsi, approximati, subfastigiati, superne pubescentes.

*Fe-*

*Folia* sparsa, brevissime petiolata, lanceolata, acuta; supra obsolete scabra, viridia; subtus tomentosa margine revoluta, patula unguicularia.

*Capitula* terminalia, globosa, magnitudine pisi.

*Corollae* albae, lanatae.

*PHYLICA hirsuta*: foliis lanceolatis acutis hirsutis, racemó folioso.

*Caulis* fruticosus, totus pilis mollibus longis hirsutus, teres, rufescens, erectus, ramosus, tripedalis et ultra.

*Rami* sparsi, valde hirsuti, virgati, ramulosi.

*Folia* alterna, brevissime petiolata, lanceolata, inermi-acuminata; supra convexiuscula, viridia; subtus tomentosa margine revoluta; erecto-patentia, unguicularia.

*Flores* racemosi a medio ad apices ramorum in axillis foliorum.

*PHYLICA rosmarinifolia*: foliis ellipticis subtus tomentosis, floribus racemosis.

*Phyllica rosmarinifolia*. Aiton Hort. Kewens.

*Caulis* fruticosus, pubescens, erectus, ramosus, bipedalis et ultra.

*Rami* sparsi, simplices, filiformes, breves, tomentosi, virgati.

B 2

Fo-

*CELASTRVS acuminatus*: inermis foliis ellipticis crenatis, floribus axillaribus subbinis.

*Caulis* fruticosus, cinereus, inermis, erectus, totus glaber, tripedalis et ultra.

*Rami* alterni, similes, ramulis angulato-striatis.

*Folia* alterna, breviter petiolata, elliptico-ovata, obtusiuscula, crenata, inaequalia, unguicularia usque pollicaria.

*Flores* axillares, e gemma solitarii, bini, terni, cernni, pedunculati.

*Pedunculi* capillares, vix lineam longi.

*CELASTRVS obtusus*: inermis foliis obovatis obtusis integris, panicula simplici axillari.

*Caulis* fruticosus, totus glaber.

*Rami* teretes, purpurascens.

*Folia* alterna, brevissime petiolata, obovata, obtusissima, integra margine revoluta, crassa, erecta, pollicaria vel paulo ultra.

*Paniculae* axillares, simplices, dichotomae.

*CELASTRVS ellipticus*: inermis foliis ellipticis integris, paniculis simplicibus axillaribus.

*INCOIS*: Camassie-hout.

*Caulis* fruticosus, inermis, curvato-erectus, totus glaber, ramulosus.

*Ra.*

*Ramuli summi angulati.*

*Folia opposita, breviter petiolata, elliptico lanceolata, obtusiuscula, integra, sesquipollicaria.*

*Flores axillares, panícula simplici.*

*CELASTRUS crispus: inermis foliis obovatis obtusius undulatis integris, floribus axillaribus umbellatis hirtis.*

*Crescit in sylvis.*

*Caulis fruticosus, inermis, teres, erectus, ramosissimus,*

*Rami alterni, similes.*

*Ramuli filiformes, flexuosi, pubescentes.*

*Folia alterna, brevissime petiolata, oblongo-ovata, obtusa, integra margine revoluta undulato, glabra, erecta, subpollicaria.*

*Umbellae axillares, pauciflorae, hirtae.*

*Pedunculi foliis multo breviores.*

*DIOSMA oblonga: foliis oblongo-ellipticis glanduloso-ctenatis rugosis, floribus lateralibus.*

*Diosma lanceolata. β. γ. Prodr. Capens.*

*Caulis fruticosus, erectus, purpureus, glaber, ramulosus, bipedalis et ultra.*

*Rami similes.*

*Ra-*

*Ramuli* subverticillati, filiformes, pubescentes.

*Folia* sparsa, ovato-oblonga, obtusa, glanduloso-crenata, rugosa, punctata, glabra, erecto-patentia, lineam longa usque unguicularia.

*Flores* in ultimis ramulis, inter folia laterali-axillares, pedunculati, solitarii.

*Diosma cuspidata*; foliis lanceolatis carinatis glabris, floribus lateralibus aggregatis sessilibus.

*Caulis* fruticosus, erectus, rufescens, glaber, superne ramosus, bipedalis et ultra.

*Rami* subverticillati, subfastigiati.

*Folia* sparsa, brevissime petiolata, lanceolata, obtusiuscula cum mucrone nigro, integra, carinata, supra sulcata, glabra, approximata, patentia, unguicularia.

*Flores* infra apices ramulorum aggregati, sessiles.

*Diosma umbellata*; foliis trigonis obtusis punctatis ciliatis, umbellis terminalibus.

*Caulis* fruticosus, nodosus, glaber, erectus, apice ramosus.

*Rami* oppositi et verticillati, fastigiati.

*Folia* sparsa, approximata, brevissime petiolata, trigona, carnea, obtusa, subtus punctata, mar-

margine ciliata imprimis superiora, imbricata, vix unguicularia.

*Florum* umbellae terminales, multiflorae.

*Pedunculi* purpurei.

*Corollae* albae.

*Variat* foliis inferioribus vix ciliatis.

*Diosma fleusta*: foliis lanceolatis trigonis ustulatis glabris, floribus subcapitatis.

*Caulis* fruticosus, scaber, cinereus, pubescens.

*Rami* similes, curvato-erecti.

*Ramuli* alterni et superne subverticillati, fastigiati.

*Folia* brevissime petiolata, lanceolata, trigona, integra, glabra, apice ustulata, imbricopatula, lineam longa.

*Flores* in apice Ramulorum aggregati, subcapitati.

*Diosma ustulata*: foliis ovatis trigonis imbricatis glabris, flore terminali solitario.

*Caulis* fruticosus, erectus, rufescens, glaber, ramulosus.

*Rami* et *Ramuli* similes, sparsi.

*Folia* ovata, trigona, obtusa, superiora acutiora, nigro-ustulata, glabra, integra, imbricata.

*Flos*

*Flos*, solitarius, in ramulis terminalis.

*ACHYRANTHES verticillata*: foliis verticillatis ellipticis, floribus verticillatis sessilibus.

*Caulis* frutescens, erectus, hirsutus, ramosus.

*Rami* alterni, filiformes.

*Folia* verticillata, circiter sena, elliptica, integra, glabriuscula, reflexa, unguicularia.

*Flores* in axillis foliorum, verticillati, sessiles, bracteis scariosis albis.

*ANETHVM capense*: foliis tripinnatis: pinnulis filiformibus setaceo, acuminatis fastigiatis.

*Incolis*: Fenkel-wortel.

*Crescit* in regionibus aridioribus.

*Radix* carnosa, oblonga, odorata, aromatica.

*Folia* radicalia, petiolata, circiter tria, erecta, glabra, tripinnata, spithamea.

*Pinnae* oppositae, petiolatae.

*Pinnulae* incisae laciniis filiformi-setaceis, fastigiatis, fasciculatis, brevissimis, apice setaceo-acuminato.

*RHVS rosmarinifolium*: foliis ternatis subtus tomentosis: foliolis sessilibus linearibus.

*Crescit* vulgare in Capite bonae spei.

*Cau-*

*Caulis* fruticosus, erectus, quadripedalis et ultra.

*Rami* et *Ramuli* alterni, pubescentes, virgati.

*Folia* petiolata, ternata.

*Foliola* sessilia, lineari- elliptica, acuta, supra glabra, subtus albo-tomentosa, unguicularia.

*Flores* paniculati panicula patula, composita.

*Pedunculi* et *Pedicelli* capillares.

*Rhus rosmarinifolium* Willden. Spec. Pl. Tom. I.  
p. 1484.

*Rhus glaucum*: foliis ternatis glaucis: foliolis sessilibus obcordatis.

*Caulis* fruticosus, cinereus, glaber, erectus, ramulosus.

*Rami* *Ramulique* similes, alterni, flexuosi.

*Folia* alterna, petiolata, glabra, ternata.

*Foliola* sessilia, obcordata, integra margine revoluta, supra glauca, subtus viridia, glabra, unguicularia.

*Paniculae* terminales.

*Differt a R. lucido*: foliolis glaucis, obcordatis.

*Rhus mucronatum*: foliis ternatis glabris: foliolis cuneiformibus mucronatis.

*Caulis* fruticosus, glaber, erectus, ramosus.

*Ra-*



*Rami* alterni *ramulis* filiformibus.

*Folia* petiolata, alterna, glabra, ternata.

*Foliola* sessilia, obovato - cuneiformia, acuta cum mucrone, integra, glabra, unguicularia.

*Petioluli* brevissimi.

*Paniculae* laterales.

*Differt* a *R. lucido*: foliis acutis, nec excisis.

*Rhvs crenatum*: foliis ternatis glabris; foliolis cuneiformibus apice crenatis.

*Caulis* fruticosus, erectiusculus, cinereus, villosus, ramosus, bipedalis et ultra.

*Rami* et *Ramuli* alterni, teretes, villosi.

*Folia* petiolata, ternata.

*Foliola* sessilia, cuneata, apice 3- usque 7- dentata, integra margine revoluta, glabra, supra laevia, subtus paulo obscuriora, unguicularia.

*Paniculae* axillares.

*Rhvs dimidiatum*: foliis ternatis tomentosis: foliolis cuneatis inoasis, lateralibus dimidiatis.

*Caulis* fruticosus, cinereus, glaber, flexuosus, subscandens, ramosus.

*Ra*

*Rami et Ramuli* teretes, flexuosi, ultimi pubescentes.

*Folia* sessilia, tenuissime cinereo-tomentosa, ternata.

*Foliola* sessilia; *lateralia* latere interiori angustiora, integra, exteriori rotundata incisa; margo revolutus; unguicularia: *intermedium* cuneatum, tridentatum.

*Flores* laterales.

*Bacca* simplex, bi- et tricocca.

*Rhvs dissectum*: foliis ternatis subtus tomentosis: foliolis argute incisis.

*Caulis* fruticosus, fuscus, glaber, ramosus.

*Ramuli* filiformes, alterni.

*Folia* petiolata, supra viridia, subtus niveo-tomentosa, ternata.

*Foliola* dissecta seu argute incisa, dentibus 2, 3 vsque 7, acutis.

*PHARNACEVM mucronatum*: foliis ovatis mucronatis, floribus verticillatis.

*Caulis* herbaceus, subnullus; sed

*Folia* subradicalia, aggregata, basi attenuata, ovata, mucronata, integra, concava, glabra, semilineam longa.

*Pe*

*Pedunculi* subradicales, capillares, plures, flexuoso-erecti, glabri, inaequales, digitales.

*Flores* verticillato-aggregati, breviter pedunculati, involucrati bracteis ovatis mucronatis.

*PHARNACEVM distichum*: foliis subsenis lanceolatis, paniculis axillaribus.

*Caulis* herbaceus, filiformis, uti tota planta glaber, debilis, decumbens, raro ramosus, articulatus.

*Rami* alterni, simplices.

*Folia* in articulis subsena, lanceolato-elliptica, integra, glabra, reflexa, vix pubescentia, inaequalia, vix pollicaria.

*Paniculae* axillares, pedicellis dichotomis capillaribus.

---

Plantae missae a Thunb. 1802.

---

Carex heleonast.

glareosa

pallescens

panicea

filiformis

flava

cespitosa

vaginata

dioica

atrata

ampullacea

praecox

pilulifera

gracilis

canescens

leporina

muricata

intermedia

vulpina

tenuiflora

lagopoides

petraea

Carex

*Carex alpina*  
*globularis*  
*incurva*  
*capitata*  
*leucoxydon*  
*curta*  
*capillaris*  
*limosa*  
*chordorrhiza* sive *uliginosa* Linn.  
*saxatilis*  
*lasiocarpa*.

---

*Saxifr. oppositifolia*  
*Androsace septentrion.*  
*Diapensia lappon.*  
*Andromeda calyculata*  
*hypnoides*  
*tetragona*  
*Meesia uliginosa*  
*Cerastium alpinum*  
*Azalea lapponica*  
*procumbens*  
*Statice Armeria*  
*Orchis latifolia?*  
*Ledum palustre*  
*Phlox alpinum*  
*Dianthus superbus*

*Iuncus*

*Iuncus inflexus*  
     *trifidus*  
     *parviflorus*  
     *filiformis*  
*Pedicularis Sceptrum*  
*Bartsia alpina*  
*Lycopod. complan.*  
*Pyrola rotundifol.*  
     *minor*  
*Hottonia palustr.*  
*Trifol. agrarium*  
*Fritillaria Meleagris*  
*Ophrys monorchis*  
*Schoenus ferrugin.*  
*Salicornia indica*  
*Splachnum fastigiat.*  
*Splachnum luteum.*  
*Cactus grandiflor.*  
*Bryum annuin.*  
*Didymodon capillac.*  
*Fucus natans*  
*Panicum dactylon*  
*Corrigiola capensis*  
*Utricularia media*  
*Celosia cristata?*  
*Aster Tripolium*  
*Cytisus austriacus*  
*Phaca alpina*  
*Elatine Alsinastr.*

C

Are-

*Arenaria peploides*  
*Rhamnus lineatus*  
*Circaea alpina*  
*Chara tomentosa*  
*Silene rupestris*  
*Linnaea borealis*  
*Artemisia rupestris*  
*Veronica spicata*  
*Medicago falcata*  
*Ranunculus Lingua.*

---

## II.

## Supplementa ad Observationes Botanicas

A. I. Retzili.

**H**OLMSKIOLDIAE sanguineae descriptionem dedi  
in Observ. Botan. Fasc. VI. p. 31 (\*): iconem  
pulcherrimae fructus iam addo (Tab. III.):

Cē-

(\*) HOLMSKIOLDIA. (Willd. Spic. pl. 3. p. 360):

Character essentialis.

*Calyx* ampliatus patentissimus.

*Corolla* ringens.

*Capsula* unilocularis? polysperma.

HOLMSKIOLDIA sanguinea.

*Frutex* ramis tetragonis; cortice cinereo; levi.

C 2

Folia



*CESTRUM citrifolium* nobis.

*Frutex* ramis laxis debilibus, longis, cortice albido.

*Fo*

*Folia* opposita cordata vel ovata, acuta, serrata, petiolata, punctata, nervis tomentosis, subtus pallidiora;

*floralia* subrotunda vel ovata, saepius integerrima.

*Pedunculi* axillares oppositi, multiflori, foliosi.

*Calyces* et *Corolla* sanguineae.

*Habitat* in vallibus Bengaliae.

*Calyx* amplus, campanulatus, patentissimus, integer, dentibus quinque minimis vix observandis.

*Corolla* ringens, calyce longior.

*Tubus* basi dilatatus demum angustatus, versus limbum curvatus.

*Faux* ampliata.

*Labium superius* breve, bifidum, laciniis rotundatis;

*inferius* elongatum, trilobum: laciniis lateralibus rotundatis: inre media fornicata emarginata.

*Stamina* didynama, corolla longiora; *filamentis* compressis.

*Antherae* ovatae in dorso gerunt corpusculum nigrum, sub quo immittitur filamenti apex; subtus quadrisulcatae.

*Germen* semiovatum.

*Stylus* staminibus longior apice incurvus.

*Stigma* acutum levissime bifidum.

*Capsula* polysperma.

*Folia* magna, petiolata, ovata, acuta, integra, nitida, utrinque nuda, coriacea, nervosa. *Petioli* nigri, nitentes.

*Flores* in corymbo sessili suboctoni, axillares inodori.

*Calyx* tubulosus basi teres, superne prismatico - quinquangularis, quinquedentatus.

*Bractea* parva fere subulata, calyci adpressa.

*Corolla* flavescens, tubo calyce duplo longiore sub limbo parum contracta; lacinae limbi extus saepius fuscae, erectae, convolutae, subulatae, hora tertia pomeridiana explicantur ac patent semiovatae, et sub nocte iterum involvuntur.

In caldario floruit. Patriam ignoro. An *venenatum* Thunb.?

#### *SILENE bifida.*

*Planta* annua.

*Caules* erecti, ex axillis ramosi, pilosiusculi.

*Folia* inferiora obovata, superiora oblanceolata acuta, basi ciliata, opposita.

*Flores* racemosi, unilaterales, rosei.

*Calyx*

*Calyx* clavatus, hirtus, albidus, angulis decem viridibus, dentibus quinque obtusis barbatis.

*Petala* obcordata, ultra medium bifida.  
*Corona* faucis bifida, pallida.

*Stamina* longitudine unguium.

*Germen* intra calycem pedicellatum.

*Styli* longiores, interiore latere *stigmatibus* villosis longitudinali.

*Capsula* subrotunda impressionibus tribus acutis lateralibus semitrilocularis ore sexdentato dehiscens, insidens pedicello elongato, incrassato, sulcato.

*Semina* reniformia, compressa, dorso bica-  
rinato rugoso.

*SILENE* *dicolor* caulibus decumbentibus, floribus solitariis oppositis, capsulis ovato-trigonis trilocularibus.

*Radix* biennis fuit.

*Caules* bi-tri-pedales, nudi, decumbentes.

*Folia* radicalia lanceolata, caulina linearia, glaucescentia, margine ad basin tenuissime ciliata.

*Flores*

*Flores* oppositi, solitarii, axillares paniculam paucifloram terminalem offerunt, pedunculati, nutantes, pedunculis di-  
phyllis.

*Calyx* elongatus, cylindricus, obscure decemangulatus.

*Petala* bifida, subtus dense fusco-venosa, supra alba vix ad rubedinem vergentia. Dentes coronae petalis appressi.

*Stamina* inter petala recurvata.

*Stigmata* subspiralia, villosa, longitudinaliter altero lateri styli adnata.

*Capsulae* oblongo-ovatae a tribus lateribus nonnihil compressae, triloculares, ore sexdentato.

*Semina* reniformia fusca, venosa, dorso sulco acuto carinaque duplici.

Utriusque semina ab amiciss. Thouin habui.

*ROSA laxa* caule aculeato aculeis stipularibus, petiolis pedunculis germinibusque oblongis nudis inermibus.

*Radice* multum repit.

*Caules* quinquepedales, versus summitatem praecipue laxi flexuosi, ramis laxis pendentibus.

*Acu-*

*Aculei* recurvi plerumque bini sub petiolis, in ramis solitarii.

*Petioli* inermes, villosiusculi: stipulis serrulato-glandulosis.

*Foliola* novem ad undecim ovata, acuta, nuda, serrata, basi ad  $\frac{1}{3}$  integra, nervis villosis.

*Pedunculi* inermes subquadriflori; sub quovis stipula ovata serrulata apice trifida, lacinula media lineari longiore.

*Pedicelli* bibracteati, bracteis ovato-lanceolatis, serrulatis glabris.

*Germina* oblonga nuda.

*Calycina* foliola nuda, integra, tribus in foliolum lanceolatum apice expansis, vix villosis, longitudine petalorum.

*Petala* alba, emarginata, parum odora, odore cinicino, qualem offert *R. lutea*.

*Fructus* ruber, oblongus, versus basin incrassatus nec supra infraque decrescens ut in *R. canina*.

*Rosa microcarpa* caule petiolisque aculeatis, calycibus integerrimis glandulosis, pedunculis inermibus, germinibus ovatis nudis.

*Radix* haud repens.

*Can-*

*Caules* quinquepedales, stricti, aculeati.

*Aculei* recurvi substipulares et sparsi.

*Petiololi* subtus dense aculeati, subvillosi, stipulis minutis serrulatis glandulosis.

*Folia* septena foliolis undique serrulatis, supra rugosa, subtus villosula, ovata.

*Pedunculi* tri-quadriflori, nudi, inermes,

*Bractea* sub quovis pedicello ovato-acuminata, serrulato-glandulosa, rarius trifida.

*Pedicelli* nudi, glabri, bibracteati, bracteis latis acuminatis.

*Germen* ovato-oblongum, nudum, glabrum.

*Calycina folia* parce glandulis pedicellatis aspersa, integerrima, petalis breviora, tribus apice parum dilatatis.

*Petala* rosea, fere biloba, grate odora.

*Fructus* ruber, parvus, ovato-oblongus, collo angustato.

Utraque haec & Seminibus Sibiricis excrevit.

#### LEPIDIUM didymum.

Descriptio a Cl. HUDSON in Fl. Angl. data cum nostro in omnibus non convenit, quare hanc damus.

*Planta* annua, palmaris, pedalis.

Can.

*Caules* erectos non vidi, sed vel decumbentes, vel semierectos, pilosos.

*Folia* radicalia simplicia, subrotunda, crenata, caulina pinnata: pinnis sublanceolatis hinc integerrimis, inde dentato-incisis. *Petioli* supra plani.

*Pedunculi* axillares, racemosi.

*Calyx* laevis, foliolis cymbiformibus acutis.

*Corolla* nulla, rarius rudimenta petalorum.

*Filamenta* ad utrumque tetrameris latustria conico-subulata, quorum duo exteriora alba divergentia sine antheris, in medio anthera grandiuscula.

*Pistillum*, *germen* grande didymo-compressum. *Stigma* capitatum sessile.

*Silicula* didyma punctis elevatis rugosa, non dehiscens sed in duas partes divisa decidit.

Lepidiis quidem affine, at genere diversum puto.

#### ERYSIMUM rubellum.

Planta annua pedalis et ultra.

*Caulis* teretiusculus, foliosus, setis furcatis aspersus.

Fo-

*Folia* lanceolata, dentata, alterna, utrinque hispida; setis simplicibus et furcatis.

*Flores* in summitate caulis axillares, sessiles, parvi, carnei.

*Calyx* linearis, subcylindricus, clausus, hispidus.

*Petala* obovata, integerrima, carnea macula rubella infra medium, fauce viridi.

*Siliqua* patens, tripollicaris et ultra, linearis, quadrangula, valvulis tenuibus, dissepimento crassiore, in quo semina impressa latent.

*Semina* ovata, luteola stria media viridi, hinc planiuscula, inde convexa, minime marginata.

Sub nomine *Cheiranthi parviflori* data, ob Siliquas vero et semina potius huius generis.

### **HESPERIS parvula.**

Planta annua palmaris, pedalis.

*Caulis* subteres pilis glandulosis raris aspersus.

*Folia* inferiora sinuata, superiora oblanceolata, dentata, petiolata, pilis brevissimis glanduliferis raris aspersa.

*Flo-*



*Flores* terminales, pedicellati.

*Calyx* linearis, fere cylindricus, fetosus.

*Petala* linearia, obliqua, integerrima, basi  
margine undulata, rubella.

*Siliqua* patentissima, teretiuscula, toru-  
losa, apice ex stylo elongato subulata,  
valvulis tenuissimis vix dehiscens, dis-  
sepimento crasso fungoso, in quo semina  
latent.

*MADIA viscosa.*

*Planta* annua bi - tripedalis.

*Caulis* simplex, teres, pilosus.

*Folia* inferiora opposita, linearia, sessilia,  
integra, utrinque pilosa, pilis marginum  
glandulosis;

superiora alterna, lanceolato-linearia,  
sessilia, ceterum similia.

*Flores* sessiles, subsolitarii ex alis folio-  
rum superiorum, at peracta florescentia  
elongantur pedunculi folio uno alterove  
lanceolato instructi.

*Ca-*



*Receptaculum nudum.*

Si reliquae *Madiæ* eadem structura calycis gaudent, character generis erit:

*Calyx interior monophyllus flores disci septens.*

**GALINSOGA laciniata.**

*Planta annua.*

*Caulis* erectus, ramosus, tripedalis; teres, sulcatus, sparsim pilosus.

*Folia* opposita, lanceolata, trinervia, dentata, dentibus oppositis nonnunquam in lacinias elongatis, parce ciliatis.

*Pedunculi* terminales terni, uniflori, elongati; teretes, pilosi, bracteola lineari in medio.

*Calyx* hemisphaericus, foliolis interioribus apice membranaceo reflexo, exterioribus brevioribus, omnibus obtussissimis.

*Corollulae Radii* late ovatae, trifidae, foemineae luteae basi fuscae.

*Disci* quinquesidae, antheris fuscis.

*Utrisque germen* tereti - turbinatum minutissime hispidum.

*pappus* corona brevis multidentata.

Rud.

*RUDBECKIA alata* forte potius *Helenii* species, nam radius *Helenii*, palcae plane nullae inter semina, et flores radii nonnunquam semina perficiunt.

*SILPHIUM trifoliatum* Lin. caulibus sexangulis, foliis ternis ovatis dentatis, panicula trichotoma.

*Radix* perennis.

*Caules* ultra sexpedales, sexanguli, laeves.

*Folia* ternato-verticillata, inferiora petiolata: petiolis basi caulem cingentibus, superiora subsessilia, infima et suprema lanceolata, media ovato-lanceolata, omnia inaequaliter dentato-serrata, scabra.

*Panicula* trichotoma.

*Folia calycina* trinm ordinum.

*SILPHIUM ternatum* caulibus teretibus, foliis ternis, subdenticulatis, panicula dichotoma.

*Radix* perennis.

*Caules* quadripedales, teretes, laeves.

*Folia* inferiora et suprema sparsa, media, ternato-verticillata, paniculae binata, caulina petiolata, paniculae sessilia, omnia lanceolata, parce denticulata, denticulis minutis, scabriuscula, versus basin inprimis ciliata.

*Panicula* dichotoma.

*Folia calycina* quatuor ordinum, ciliata.

*Ra-*

*Radius* floris latior quam in praecedente,  
sed disci flores breviores.

**SILPHIUM atropurpureum**, caulibus teretibus, foliis subquaternis opposite denticulatis, panicula dichotoma.

*Radix* perennis.

*Caules* quadripedales, teretes, laeves, atropurpurei.

*Folia* infima alterna, proxima terna, superiora quaterna, suprema sparsa, at ubi quaterna sunt per paria inaequaliter sita nec proprie verticillata; praeterea petiolata, petiolis ciliatis, lanceolata, scabra, opposite denticulata, obscure viridia nervo supra atropurpureo.

*Panicula* dichotoma, pedunculis brevioribus.

*Calycina foliola* trium ordinum, lanceolata.

*Radius* reliquis angustior.

Omnes tres Septentrionalem inhabitant Americam.

**POPULUS balsamifera** genuina Linnæi sine omni dubio est *Populus candicans* recentiorum, quam per plures annos coluit à LINNÆ, quamque apud illum ipse vidi. Haec quoque est Sibiriae incola, cuius iconem dedit gen. PALLAS in Flora Rossica. Quum utriusque arboris flores masculos et foemineos haud vidi.

## III.

Cardamine *hirsuta* und *sylvatica*.

Unterschieden

von

H. F. L i n k

Professor zu Rostock.

Cardamine *hirsuta* Weberi et Oederi ist eine in den Wäldern des nördlichen Deutschlands nicht ungewöhnliche Pflanze. Als ich Cardamine *hirsuta* Linnaei zuerst in Spanien und Portugal fand, fiel mir der Unterschied sehr auf, und ich hielt die letztere für eine besondere neue Art, bis ich mich durch Vergleichen überzeugete, daß sie die ächte Cardamine *hirsuta* Linn. sey. Noch mehr wurde ich in dieser Meynung bestärkt, als ich dieselbe C. *hirsuta*, durch ganz  
D Eng-

England häufig an den Wegen sah. Ich fand nun *Cardamine hirsuta* Weberi wiederum in einem Walde in Meklenburg, und nach genauer Vergleichung muß ich beyde für verschiedene Arten halten. Schon der Standort ist verschieden. *C. hirsuta* Weberi habe ich nie anderwärts als in Wäldern gesehen, *C. hirsuta* Linn. wächst auf Schutt, auf Mauern, an Wegen und ähnlichen Oertern; ich will auch daher die erste *Cardamine sylvatica* nennen. *Cardamine sylvatica* ist gröfser, hat viel kleinere Blumen, schmalere Blättchen und 6 Staubfäden, *C. hirsuta* ist kleiner, hat aber gröfsere Blumen, runde Blättchen und 4 Staubfäden. Doch ich will die ausführliche Beschreibung beyder hersetzen.

*Cardamine sylvatica.*

Radix simpliciuscula, penetrans, elongata.

Caulis  $\frac{1}{2}$  pedalis-pedalis, flexuosus, ex axillis ramosus, angulatus, pilis dispersis erectis.

Folia radicalia et caulina plura, exstipulata pinnata, pilis dispersis; inferiorum foliola petiolata, oblonga et lanceolata, extimo ovali et subrotundo; mediorum lanceolata et oblonga omnia, dentato-incisa; dentibus raris.

In-

Inflorescentia dum floret subcorymbosa, dein racemosa. Bractæae nullae. Pédicelli patentes, angulati, 3-4 lineares.

Calyx tetraphyllus, patulus, phyllis oblongis glabris viridibus, margine purpurascente. Glandulae 2 pone stamina minora.

Corolla tetrapetala, petalis calyce duplo longioribus obverse lanceolatis albis. Glandulae 2 pone stamina maiora.

Stamina tetradynama, corollae aequalia. Filamenta filiformia, Antherae parvae incumbentes (libratae) flavae.

Germen elongatum. Stylus brevis teres germine vix tenuior. Stigma dilatatum, floccosum.

Silqua teretiüscula compressa, torulosa, pollicaris, rostro parum angustiore vix lineam longo apice e stigmate persistente. Valvulae elasticae. Semina in unicam coordinata seriem, ovalia, fere aequilata compressa.

Die Rauigkeit der Pflanze ist vielen Abweichungen unterworfen. Ich habe beständig sechs Staubfäden gefunden, nie vier.

D 2

Car-



*Cardamine hirsuta.*

Radix simpliciuscula, penetrans, elongata, saepe longissima.

Caulis biuncialis-semipedalis, rarissime pedalis, parum ramosus, aut ramis non perfectis angulatus, pilis dispersis.

Folia radicalia plura, caulina pauciora, exstipulata, pilis dispersis; inferiorum et mediorum foliola subrotunda, petiolata repando-dentata; summorum tantum ovalia et oblonga, dentato-incisa, dentibus raris.

Inflorescentia dum floret subcorymbosa, dum frutescit racemosa. Bractee nullae. Pedicelli 3 linear. minus patentes.

Calyx tetraphyllus minus patulus, phyllis oblongis viridibus, margine purpurascentibus. Glandulae 2 minus conspicuae pone stamina minora.

Corolla tetrapetala, petalis calyce duplo et ultra saepe longioribus obverse lanceolatis albis, saepe purpureo-venosis.

Stamina quatuor, corolla minora. Filamenta filiformia. Antherae parvae incumbentes luteae.

Pistillum et Siliqua ut in praecedente.

Die

Die Rauhigkeit ist sehr verschieden. Aus Portugal habe ich ganz glatte Exemplare, aus Cornwall ganz rauhe, so gar ist der Kelch rauh. Staubfäden habe ich immer, so oft ich auch die Pflanze untersuchte, nur vier gezählt.

Nun zur Berichtigung der Synonymen. Ueber *Cardamine alpina media* Clus. Hist. p. CXXVIII. pann. 455, läßt sich nichts gewisses bestimmen. Zu *Sisymbrium-Cardamine hirsutum minus flore purpureo* Jo. Bauh. II. 838, ist eine nicht üble Beschreibung und Abbildung der *Card. hirsuta*. Was er von Thalius anführt, gehört zu *Card. sylvatica*; ich besitze die Schrift von Thalius nicht. *Nasturtium aquaticum minus* Casp. Bauh. Pin. p. 104. gehört vermuthlich zu *C. hirsuta*. *Cardamine sylvestris minor italica* Barrel. ic. 455, ist *C. hirsuta*. Linné, welcher diese Pflanze aus Holland besonders kannte, unterscheidet sie Hort. Cliffort p. 336, bestimmt durch die vier Staubfäden, und sagt raro minora ista duo exserens. Ob er je sechs gesehen habe, läßt sich noch zweifeln. In beyden Ausgaben der *Flora Suecica*, wo er nur eine Stelle in Schonen für den Standort der *C. hirsuta* angiebt, meynt er ebenfalls unsere oben so genannte, und es ist wahrscheinlich, daß er *C. sylvatica* nie gekannt habe. Auch Haller *Histor. stirp.* redet n. 472 var.

$\alpha$  et  $\beta$  von *C. hirsuta*. Wohin die in Deutschland sogenannte *Card. parviflora* gehöre, kann ich nicht sagen; die Kennzeichen von Linné's *Card. parviflora* führt Smith *Flor. britt.* T. 2, p. 698 an. Die Floristen aus dem südlichen Europa reden alle von *Cardamine hirsuta*, so auch die englischen Botaniker, welche man bey Smith *Fl. br. l. c.* findet. Lamarck *Fl. franc.* 527, wirft *C. Impatiens*, *parviflora*, *hirsuta* sehr unrecht zusammen. *Cardamine hirsuta* Pollich *Pal. n.* 620, ist unsere *C. sylvatica*. Pollich sagt *filamenta quatuor, quinque, sex numeravi*, aber Angaben dieser Art sind mir immer verdächtig, und ich zweifle, ob man je fünf Staubfäden in einer *corolla cruciata* gesehen hat. Wahrscheinlich fand er sechs, aber er nahm Rücksicht auf Linné's Diagnose, so wie Linné vielleicht selbst auf die ungewöhnliche Anzahl von vier Staubfäden, indem er sagt: *raro ista minora exserens*. Oeder *Fl. dan. t.* 148, ist *C. sylvatica* und *C. Impatiens t.* 735 *C. hirsuta*. Eben so schon Rupps *Cardamine sylvatica, hirsuta, flore lacteo, parvo* *Fl. Ien. p.* 30, wo Hallers Anmerkung die *C. sylvatica* deutlich bezeichnet. *Cardam. hirsuta* Kröcker *Sil. V. 2. P. 2. p.* 56, scheint ebenfalls *C. sylvatica*. *C. hirsuta* Schrank, *Fl. bav. T. 2. p.* 196, scheint *C. hirsuta*. Roth, *Fl. germ. T. 2. p.* 120

p. 120, vermengt beyde Arten. Weber, Spicil. Fl. gött. p. 18 beschreibt sehr genau unsere *C. sylvatica*. Nach diesem scheint *C. sylvatica* eine Deutschland eigenthümliche Pflanze zu seyn, hingegen *C. hirsuta* mehr dem wärmern Europa anzugehören, ob sie gleich in Schonen, welches aber Pflanzen warmer Himmelsstriche erzeugt, sich findet.

## IV.

Bemerkungen über einige Arten

der

G a t t u n g C a r e x.

Von

H. F. L i n k,

Professor zu Rostock.

Herr Schkuhr hat sich durch seine vortreffliche Monographie der Gattung Carex um die Botanik sehr große Verdienste erworben, Ueberzeugt von der Genauigkeit dieses Beobachters sandte ich ihm alle Arten dieser Gattung zu, welche ich auf meiner Reise mit dem Herrn Grafen von Hoffmannsegg in Spanien, und Portugal gesammelt

let hatte. Alle Monographien verdienen die größte Unterstützung eines jeden, dem es um Vervollkommen der Wissenschaft zu thun ist, besonders, wenn ein Botaniker, wie Herr Schkuhr, eine solche ankündigt. Es wäre thöricht, wenn man nicht die kleine Eitelkeit, eine Art zuerst beschrieben zu haben, jenem höhern Zwecke aufopfern wollte.

Unter den Arten, welche ich Herrn Schkuhr zusandte, war auch eine, die er für *Carex lobata* hielt. Ich habe seit der Zeit vollständigere Exemplare erhalten, als ich damahls übersenden konnte, und werde in meiner Meinung bestärkt, daß diese Pflanze nicht *Carex lobata* sey. Unsere wächst auf den warmen etwas feuchten Ängern um Setuval, Azeytão, wo an keine Alpenpflanze zu denken ist, *Carex lobata* ist eine Alpenpflanze. Doch hiezu kommen noch andere Kennzeichen, und ich will daher die vollständige Beschreibung einrücken.

*Radix fibrosa. Caulis sub terra repens vaginis foliorum tectus.*

*Caulis (culmus)  $\frac{1}{2}$  pedal. - pedalis firmus, erectus, triqueter, aciebus hebetatis, laevis, glaber.*

Fo-

Folia vaginata, caule breviora, vagina laxiuscula, clausa, brevi, scariosa, folio ipso lineari, angusto, acuto rigido, canaliculato, marginibus et carina antrorsum scabris, omnia in basi culmi.

Spica terminans e spiculis 3-4 approximatis oblongis, demum ovalibus, inferior interdum fulta bractea foliacea brevi ovali longe acuminata viridi, marginibus ferruginea. Interdum et reliquae spiculae fulciuntur bractea ovali longe acutata, antrorsum scabra ferruginea, margine albo, dorso pallescente.

Spiculae superne masculae.

Squamae genitalia tegentes ovaes ferrugineae margine albo, carina pallida in apicem acutum exeunte.

Stam. 3 antheris luteis erectis. Stigmata 2.

Perigynia (capsulae) squamis non multo longiora profunde bifida, aciebus antrorsum scaberrimis.

Differt a *Carice lobata* caule firmo erecto, perigyniis profunde bifidis.

*Carex ptychocarpa* Bot. Journ. T. 2. p. 309 hält Herr Schkuhr für einerley mit *C. gynobasis*, und ich habe nichts dawider, wenn  
gleich

gleich die Beschreibung von Villars in einigen Stücken abweicht, und die Frucht so erhabene Streifen hat, daß auch ein flüchtiger Beobachter sie wohl nicht übersehen kann. Es scheinen mehrere Arten unter den Synonymen zu *C. gynobasis* enthalten zu seyn.

*Carex ambigua* Bot. Journ. l. c. p. 308, hält Herr Schkuhr für eine neue Art, dessen vollständige Beschreibung ich hier einrücken will.

*Radix fibrosa.* *Caulis sub terra repens vaginis foliorum obtectus.*

*Caulis spithameus erectus at debilis, triqueter, aciebus acuatis, antrorsum scabris.*

*Folia radicalia plura, caulem saepe superantia, vagina brevi laxa; caulina pauca vagina clausa brevi alba; omnia linearia angusta, carinata, antrorsum scabra, viridia.*

*Spica terminans simplex androgyna, superne mascula, inferne flosculis paucis femineis; squamis flosculorum masculorum oblongis obtusis flavescentibus, dorso virescenti; squamis flosculorum femineorum similibus at brevioribus. Bractea nulla, aut folium breve vagina brevissima.*

*Spica*



Spica altera in medio caulis ex axilla folii breviter vaginati longissime pedicellata, androgyna aut mascula, flosculis femineis deficientibus.

Spica tertia inter folia radicalia erumpit, longe pedicellata androgyna aut plane feminea.

Stam. 3. Stigmata 2. Perigynia squamas vix superantia oviformia, obscure triloba, costis tribus, acumine parvo detruncato.

Ich nenne diese Art ambigua, weil sie ganz das Ansehen der Arten spiculis sexu distinctis hat, ungeachtet die spiculae meistens androgynae sind. Sie kommt der *C. gynobasis* ziemlich nahe, findet sich an denselben, doch in noch höheren Gebirgen.

*Carex depressa* Bot. Journ. l. c. ist ebenfalls eine neue Art, deren vollständige Beschreibung ich hier mittheilen will.

Rad. fibrosa. Caules cespitosi sub terra non longe prorepentes, vaginis fuscis obtecti.

Caulis semispithameus, inferne foliis radicalibus obtectis, superne tenuior, ut fere pedunculus sit radicalis, triqueter, aciebus acuatis antrorsum scabris, glabris.

Folia

Folia radicalia plurima caule longiora, densa; vagina brevi, laxa, fusca; caeterum latiuscula, recurva carinata, fere conduplicata, infra striata, laevis; caulina pauca saepe nulla.

Spica terminans oblongo-lanceolata mascula, bractea brevi subfoliacea; squamis lanceolatis longe acutatis ita ut e dorsi carina fere aristatae, antice antrorsum scabra, medio virescente, lateribus dilatatis pallide fuscis, in sole aureo-splendentibus.

Spica altera aut ex axilla folii caulini, aut ex axillis foliorum radicalium, longe pedicellata, feminea, squamis ut in mascula. Tertia inter folia radicalia provenit, feminea alteri similis.

Stam. 3. Stigmata 2. Perigynia squamis breviora triquetra, aciebus obtusatis, rugulosa, acumine brevi detruncato.

In den dürren Heiden der Provinz Alemtejo, auf dem Wege nach Campo de Ourique sieht man diese Pflanze hin und wieder, welche einige, doch entfernte Aehnlichkeit mit *C. humilis* hat.

Die Abtheilungen dieser Gattung, welche Herr Schkuhr gemacht hat, sind künstlich, und zum Aufsuchen einer Art sehr bequem, aber ich würde

würde die Arten lieber in einer natürlichen Ordnung folgen lassen, und einen Clavis voranschicken, worin man sie nach künstlichen Abtheilungen bequem aufsuchen könnte. So machen die *Carices spica radicali* eine natürliche Abtheilung aus.

Ich gab im Bot. Journal kurz die Charactere von einer neuen Art *Carex helodes* an. Wir hatten diese zuerst *C. patula* genannt, und dieser Name war auch dem Exemplar gegeben, welches ich Herrn Schkuhr zusandte. Nachher schien mir aber der Name *patula* unpassend, weil er schon der *C. sylvatica* von Scopoli und andern gegeben ist, und weil auch Lamarck eine andere *C. patula* beschreibt; daher veränderte ich ihn in *Carex helodes*. In meinem Tagebuche finde ich, daß die Pflanze oft drey männliche Aehren hat, daß der weiblichen auch oft 3-4 sind. *Caulis sub terra parum repens vaginis raris tectus. Folia radicalia plurima, vagina brevi laxa.* Es ist ein Schreibfehler im Botau. Journal, wenn ich Setuval als den Standort angab; diese Art wächst vielmehr auf nassen Stellen des Gereze-Gebirges, und die Vergleichung mit *Car. paludosa* taugt nichts. Uebrigens nahm ich bey der kurzen *differentia specifica* auf *Car. paludosa* keine Rücksicht.

Der

Der Name *helodes* muß, wie ich glaube, dieser Art bleiben, und *patula* der Verwirrung wegen, fürs erste, keinem *Carex* gegeben werden.

*Carex fasciculata* hat Herr Schkuhr nach dem ihm gesandten Exemplar sehr genau beschrieben. Ich setze aus meinem Tagebuche Folgendes hinzu. *Caulis sub limo longe repens, vaginis fuscis elongatis tectus. Folia radicalia plura longissima, vagina mediocri laxiuscula, caeterum caulinis simillima.* Diese ungemein schöne Art wächst um Setuval, Azeytao n. s. w. auf feuchten niedrigen Plätzen. Ungeachtet ich die Aehren immer büschelförmig sah, so glaube ich doch mit Herrn Schkuhr, daß sie auch einzeln vorkommen.

Ebenderselbe führt sehr richtig meine *Carex trachycarpa* bey seiner *C. flacca* an, und ich habe ihm als *C. trachycarpa* das Exemplar geschickt, welches er tab. Zz n. 113. abgebildet hat. Die Unterschiede, welche er p. 118 anführt, bewogen mich, eine besondere Art aus diesem Riedgras zu machen, auch finde ich die Fruchtbehälter weit stärker gezähnt, als an unserer deutschen *C. flacca*. Uebrigens ist der Habitus verschieden; die portugiesische Pflanze  
ist

ist stärker, gedrungener, blättervoller, als das schlanke deutsche Riedgras. Dieses ist meistens blaulich, jenes nicht. Indessen habe ich nichts dawider, es für eine, aber ausgezeichnete Abänderung von *C. flacca* zu erklären.

---

## V.

## Merkwürdige

oder seltene

## Pflanzenarten

aus dem botanischen Garten  
zu Göttingen./ *ASTER grandiflorus*. Tab. A. Fig. 1.

*Aster grandiflorus*, foliis lingulatis integris sessilibus reflexis, ciliato-hispidis, calycibus squarrosis solitariis.

*Habitat* in America septentrionali; e Virginia in Europam primus introduxit CATESBY.  
*Floret* in horto novembr.

(Sub dio rarius flores explicat, intra aquam diutissime floret).

E

Ra-

*Radix perennis. Caulis herbaceus, erectus, strictus, rigidus, 2 pedalis circiter, teres, striato-sulcatus, pilis exstantibus rigidis hispidus, fusco-purpureus; undique ramosus: ramis alternis inaequalibus, erectis, patentibus vel divaricatis, sulcato-striatis, hispidis, uno latere saepe coloratis, undique foliis vestitis; vel floriferis simplicibus, vel in pedunculos subdivisis, rigidis, flore solitario terminatis, brachiatis, alternis, sparsis, foliolis in calycem usque productis copiosis vestitis; sub calyce incrassatis.*

*Folia caulina et ramea alterna, sparsa, lineari-lanceolata, vel antea dilatata, lingulata, reflexa, deflexa, acuta, mucronata; sessilia, subamplexicaulia, margine pilis rigidis antrorsum directis ciliata, in utraque pagina subpilosa hispida, subtus pallidiora tenui nervo medio sulcato, venis vix conspicuis percurta. Propagines intra foliorum axillas rosaceae expansae, vel foliiferae vel floriferae.*

*Calyx communis subrotundus squarrosus; constans squamis laxè imbricatis, patentibus, reflexis, lineari-lanceolatis vel potius lingulatis, margine pilis glandulosis ciliatis (inde gratus odor resinosis ut in amentis salicum) apice rubellis mucronatis, reliqua parte saturate viridibus*

bus, linea per medium ducta sulcata, basi dilu-  
tiore margineque membranacea. Squamae inte-  
riores angustiores, tenuiores, lineari-lanceolatae.  
Corolla composita radiata: Corollulae hermaphro-  
ditae numerosae in disco, Femineae ligulatae  
30-40, in radio.

Propria hermaphroditis (b) clavata: limbo  
quinquefido erecto-patente: laciniis brevibus  
acutis, externe sparse pilosis, sensim magis ex-  
plicatis lineisque 5, per infundibulum decurren-  
tibus; tubus brevis gracilis vix illo angustior,  
Color ex luteo virescens.

Femineae ligulatae (a) obverse lanceolatae  
tardius explicatae, demum patentissimae, con-  
caviusculae, apice contractae bi-tridentatae, pli-  
cato striatae, colore e violaceo et caeruleo purpu-  
reo, apice et subtus pallidiore, in brevem tubum  
subpilosum virescenti-pallidum abeuntes, mar-  
gine frequenter laciniatum.

Stamina hermaphroditis: Filamenta quin-  
que capillaria, brevissima. Anthera cylindracea,  
tubulosa, ultra flosculos prominens, flaves-  
cens, striis apicibusque subfuscis, purpurascen-  
tibus acutis.

E. 2

Pi-



Pistillum hermaphroditis: Germen oblongum dense pilosum, stylus filiformis prominens.

Stigma lutescens bifidum: laciniis conniventibus spathulatis, pubescentibus.

Femineis: Germen priori simile. Stylus filiformis duplo longior tubo. Stigmata duo aequalia linearia sulcata, erecta, furcata, obliqua, e pallido virescenti colore lutescentia, subpubescentia.

Per. nullum. Calyx in defloratis undique patens, squamis retortis.

Semina hermaphroditis: —

Pappus corollulis brevior simplex, ad lentem subciliatus.

Femineis semina:

Receptaculum planiusculum nudum, alveolatum: alveolarum marginibus acutis dentatis membranaceis.

2. *ASTER dumosus*. A. Fig. 2.

*Aster dumosus*, foliis radicalibus obovatis integerrimis, caulinis lineari-lanceolatis basi ciliatis.

*Habitat* in America septentrionali.

*Floret* in horto m. octobr. novembr.

Ra-

Radix perennis. Caulis herbaceus, 2-3 pedalis, varie flexus, declinatus, teres, glaber superne sulcato-striatus, paniculato-ramosus: ramis alternis, erectis, patentibus, subsecundis, striato-sulcatis, pilis simplicibus adspersis, uno latere saepe coloratis, undique foliis vestitis, in pedunculos simplices vel pedicellos subdivisis, foliosis: foliis densis, linearibus recurvis glabris, utrinque saturate viridibus glaberrimis, subtus nitentibus, ad lentem punctatis subconvexis, apice acutis, arista brevi subfusca terminatis. Pedunculi alterni uniflori ut rami foliolis vestiti, usque in calycem continuatis; sub calyce modice incrassati, sulcato-striati, hinc inde pilosiusculi.

Folia caulina 3-4 uncialia semipalmaria (a), lineari-lanceolata, deflexa, margine subdenticulata, scabriuscula, basi membranacea caulem amplexentia, pilis sparsis ciliata; utrinque glabra, ad lentem punctata, unico nervo cardinali instructa, sensim basin versus latescente, fasciato, venis longitudinalibus parallelis confluentibus. Folia radicalia (b) obovata, obtusa, subemarginata inaequalia, margine ciliato-scabra, apice obtusa, in petiolum brevem decurrentia, sparsis pilis obsitum, glabra, saturate viridia, crassiora, venoso-nervosa.

Ca-

**Calyx** communis semiovatus, imbricatus: squamis patentibus, lineari-lanceolatis acutis (c), aristatis recurvis, ad lentem margine subciliatis, basi membranaceis complanatis, apice viridibus teretiusculis, linea exaratis; interioribus sensim longioribus, angustioribus membranaceis.

**Corolla** composita radiata (magnitudine et forma *Bellidis perennis*). Corollulae hermaphroditae numerosae in disco. Femineae ligulatae 25-30, in radio.

**Propria hermaphroditis** (f) ex ovato infundibuliformis: limbo quinquefido erecto: laciniis subaequalibus acutis, apice incurvis, saturatiore flavescente colore tinctis, ad lentem subpilosis; tubo gracili brevi, longitudine fere infundibuli, demum purpurascens (5) lineis percursor, virescente.

**Femineae ligulatae** (d) ellipticae patentes, colore lacteae, apice bi-tridentatae, plicato striatae, in tubum brevem virescentem elongatae.

**Stamina hermaphroditis**: Filamenta quinque capillaria, brevia. Anthera cylindracea, tubulosa ultra flosculos vix prominens lutescens, fusco-striata, apicibus acutis, dilutioribus.

**Pistil.**

Pistillum hermaphroditis: Germen ovato-oblongum, pilosum, stylus filiformis. Stigma bifidum: laciniis erectis patentibus, aequalibus complanatis, apice lutescentibus pubescentibus, margine coccineis (g).

Femineis: Germen ovato-oblongum pilosum. Stylus filiformis, tubo paulo longior, concolor. Stigmata duo aequalia, patentia, linearia, compressiuscula, apice obtusa, margine eleganter coccineo fimbriata (e).

Per. nullum. Calyx in defloratis vix mutatus. Semina —

Pappus capillaris simplex, ad lentem subciliatus, flosculorum longitudine.

Femineis semina —

Receptaculum subconvexum nudum, scrobiculato-favosum.

### 3 ASTER *cyaneus*, B. Fig. 1.

Aster *cyaneus*, foliis radicalibus spathulatis obovatis, caulinis oblongis integerrimis sessilibus, pedunculis unifloris.

*Habitat* in America. *Floret* in hortis mense novembr.

Ra-

Radix perennis. Caulis herbaceus, erectus strictus, 3-4 pedalis, teres, striato-sulcatus, glaber, purpurascens, ex glauco virescens, ramosus: ramis alternis, erectis, patentibus vel simplicibus unifloris, vel in pedunculos sed rarius divisus, gradatim brevioribus, undique foliis vestitis, alternis, ovato-oblongis, oblongis, lanceolatis, erectis, adpressis, demum squamiformibus in calycem continuatis imbricatis, margine integerrimis, angustatis revolutis, apice acutis mucronulatis. Folia subaxillaria caulinis similia.

Folia caulina oblonga, ovato-lanceolata, alterna, semiamplexicaulia, margine deflexa, erecta, patentia, obliqua, acuta, mucronulata, utrinque glabra ex glauco viridia, hinc inde purpurascens, per marginem integerrima, apicem versus scabriuscula; inferne venosa, unico nervo cardinali instructa, sensim basin versus latescendo fasciato, venis parallelis stipato. Folia radicalia spathulata, obovata, ovata, oblonga subserrata, inaequalia, longe petiolata: petiolo membranaceo, canaliculato, inde a nervo medio saepe colorato; subtus pallidiora, reticulato-venosa.

Calyx communis semiovalis, imbricatus: squamis arcte adpressis ovato-lanceolatis, interioribus longioribus, lineari-lanceolatis, margine

et

et basi membranaceis, ad lentem ciliato-pilosis, apice acuto dorsoque saturate viridibus (a).

Corolla composita radiata: Corollulae hermaphroditae numerosae in disco. Femineae ligulatae 20-30 in radio.

Propria hermaphroditis ex cylindraceo infundibuliformis: limbo quinquesido erecto: laciniis aequalibus, marginatis, depressis, basi contractis ex viridi lutescentibus (d), rubellis, demum purpurascentibus (c); tubo gracili brevi  $\frac{1}{3}$  fere infundibuli, 5 lineis percursi, sparsim pilosi.

Femineae ligulatae (b) lineari-lanceolatae, patentes, colore ex violaceo vel purpureo cyaneae, apice contractae tridentatae, saepe etiam fissae, in superficie striato-plicatae, basi in tubum brevem subpilosum elongatae.

Stamina hermaphroditis: Filamenta quinque capillaria, brevia. Anthera cylindracea, flava, apice rubella, ultra flosculos prominens, demum fusco striata. Pistillum hermaphroditis: Germen oblongum, striatum. Stylus filiformis, lutescens. Stigma bifidum: laciniis erectis, conniventibus, dein prominentibus, decussatim patentibus, flavescens, pubescentibus (c).

Fe-

Femineis: Germen ut in priori glabrum. Stylus filiformis mediocris. Stigmata duo linearia, filiformia conniventia vel patentia, externe sulcata, lutescentia vel demum purpurascentia, eiusdem vel inaequalis longitudinis.

Per. nullum. Calyx in defloratis squamis laxis patens.

Semina —

Pappus capillaris, ad lentem subciliatus flosculis brevior.

Femineis semina —

Receptaculum planiusculum, subconvexum, acute scrobiculato-punctatum.

#### 4 *ASTER umbellatus*. B. Fig. 2.

*Aster umbellatus*, foliis lanceolatis basi attenuatis, integerrimis margine scabris, ramis fastigiatis caule corymboso longioribus.

*Habitat* in America, nova Scotia? *Floret* in horto m. septembr. octobr.

Radix perennis. Caulis herbaceus erectus, strictus, orgyalis, teres, striatus: striis elevatis purpurascentibus, scabriusculis (ad lentem quasi ele-

elevatis) superne ramosus: ramis ad angulum acutum oriundis, alternis elongatis inque corymbum fastigiatis, exterioribus terminali longioribus; foliosis: foliolis lanceolatis caulinis similibus; in pedunculos et pedicellos subdivisis, alternis unifloris fastigiatis, pilis incurvis adpressis squamulisque sparsis lineari-lanceolatis vestitis, sub calyce incrassatis.

Folia caulina et ramea alterna, erecta, patentia, reclinata, recurva, convexa, ex oblongo lanceolata, utrinque acuminata et glabra, margine inque medio nervo subtus scabra triplinervia, brevissime petiolata: petiolo adnato, fere semiamplexicauli, verticali inque tres strias decurrente, punctis elevatis quasi muricato. Propagines intrafoliaceae vix conspicuae.

Calyx communis oblongus semiovalis imbricatus: squamis arcte adpressis serie alternante triplici quadruplici coordinatis linearibus lanceolatis, sensim longioribus, convexis externe viridibus, interne carinatis, ad lentem margine ciliatis membranaceis, linea unica percurtis (a).

Corolla composita radiata. Corollulae hermaphroditae numerosae in disco. Femineae ligulatae 10-12 in radio.

Pro.



Propria hermaphroditis campanulata (c) lutescens: limbo 5-fido: laciniis longis revolutis acutis, plicato-lineatis, patentibus; tubo gracili longo, ad lentem sursum brevissimis sparsis pilis usque ad lacinias obsito.

Femineae ligulatae (b) lineares ellipticae albae, plicato-lineatae: luci obversae 4-lineis concoloribus per longitudinem percursae, apice brevissime et subtilissime 3-dentatae, in tubum gracilem pilosiusculum exeuntes.

Stamina hermaphroditis: Filamenta quinque capillaria, brevia. Anthera cylindracea, tubulosa, fusco-striata, ultra flosculos prominens.

Pistillum hermaphroditis: Germen oblongum subcompressum striatum pilosiusculum, pallide virescens. Stylus filiformis vix longitudinis antherae. Stigma bifidum: laciniis incrassatis spatulatis, erectis conniventibus, lutescentibus, pilosiusculis.

Femineis germen ut in hermaphroditis. Stylus filiformis, flosculis concolor, tubo longior. Stigmata duo patentia, revoluta linearia, flavescentia.

Per. nullum. Calyx squamis defloratis patens erectus.

Se -

Semina hermaphroditis solitaria, obovata, compressa, inaequilatera, lineis 5-6 longitudinalibus prominentibus percursa, umbrina, pilosinscula. Pappus capillaris (ad lentem subciliatus) seminibus paulo longior, radiis constans circiter 60 (d, e).

Femineis semina prioribus similia, sed rarius maturescentia.

Receptaculum exiguum convexum nudum, punctatum scrobiculatum, marginibus acutis.

5 *ASTER undulatus*. C. Fig. 1.

*Aster undulatus*, foliis radicalibus reniformibus, caulinis cordatis undulatis pubescentibus, petiolis alatis basi dilatatis.

*Habitat* in America septentrionali.

*Floret* in horto m. novembr.

Radix perrennis. Caulis herbaceus, erectus, 2-3 pedalis, flexuosus, virgatus, simplex, parum ramosus, striato-sulcatus, scabriusculus, teres, pubescens: pilis horizontalibus, deflexis; purpurascens, hinc inde virescens. Rami florigeri, alterni, breves patentes, racemosi, striato-sulcati, piloso-pubescentes, undique foliolis ovatis, oblongis, integerimis, pubescentibus.

ses-

sessilibus, acutis usque in calycem vestiti, simplices vel in pedicellos racematim subdivisi.

Folia tactu mollia, pubescentia, caulina et ramea alterna, ex glauco viridia, demum lutescentia, purpurascentia; superne pubescentia, subtus pallidiora, venulosa, pilosiuscula, margine undulata scabra, horizontalia, deflexa, reflexa, obliqua. Caulina inferiora cordato-ovata lateribus frequenter inaequalia, petiolata: petiolo alato, basi sua dilatata amplexante caulem, canaliculato, inferne nervo medio fasciato, saepe sanguineo producto piloso; reliqua folia sensim breviori alato petiolo instructa, demum plane evanescente, sessilia ovata, semiamplexicaulia acuta. Propagines foliosae, vel floriferae intra axillas foliorum. Folia radicalia (a) subrotunda, reniformia (vt. in *Glechoma hederacea*) margine crenato-dentata, dense pubescentia, subtus purpurascentia, longe petiolata: petiolo aequali canaliculato.

Calyx communis oblongus, imbricatus squamis lineari-lanceolatis (b) acutis; apice saturate sanguineis, margine albidis dilute sanguineis, membranaceis, subciliatis, dorso viridibus, linea percursis; exterioribus sensim brevioribus, in foliola squamosa decrescentibus.

Co.

Corolla composita radiata: Corollulae hermaphroditae numerosae in disco, Femineae ligulatae 14-15, in radio.

Propria hermaphroditis (d) ex cylindraceo infundibuliformis: limbo quinquesido erecto: laciniis acutis, apice rufescenti-fuscis, reliqua parte flavescentibus, demum sordide rubellis, tubo gracili brevi  $\frac{1}{2}$  fere infundibuli, 5 lineis percursi, sparsis pilis ad lentem obsiti.

Femineae ligulatae (c) lineari-lanceolatae, patulae reclinatae, colore diluto violaceae incarnatae, apice acutae tridentatae: dente intermedio productiore vel oblitterato, reliquis minutissimis; plicato-striatae; in tubum brevissimum sparsis pilis ad lentem obsitum terminatae.

Stamina hermaphroditis: Filamenta quinque, capillaria, brevia. Anthera cylindracea, tubulosa, ultra flosculos prominens, flavescent, demum fusco-striata, apicibus acutis.

Pistillum hermaphroditis: Germen ovato-oblongum substriatum, sursum pilosum, stylus filiformis, prominens. Stigma bifidum: laciniis incrassatis conniventibus, lutescentibus, pubescentibus.

Fe.

Femineis: Germen lineari-oblongum, substriatum, pilosum. Stylus filiformis, tubo paulo longior. Stigmata duò, linearia, filiformia, erecta, patentia, acuta, subaequalia, albido lutescentia, glabra.

Per. nullum. Calyx in defloratis squamis laxis vix patens.

Semina —

Pappus capillaris (ad lentem subciliatus) germine longior, flosculo brevior.

Femineis Semina —

Receptaculum parvum, depressum, nudum, scrobiculatum, punctatum.

*ASTER pendulus.* C. Fig. 2.

*Aster pendulus*, foliis lanceolatis subserratis reflexis, ramis divaricatissimis pendulis, caule pubescente.

*Aster pendulus*, foliis elliptico-lanceolatis serratis glabris: ramulorum remotiusculis, ramis divaricatissimis pendulis, caule pubescente.  
*Ait. Kew. 3. p. 204.*

*Habitat* in America, Canada, *Floret* in horto mense novembri.

Ba-

*Radix perennis. Caulis herbaceus 3-4 pedalis, inferne erectus, superne ramosissimus, diffusus, flexuosus, deflexus, e viridi purpurascens striato-angulosus pubescens. Rami patentes, alterni, virgati, divaricati, deflexi, reflexi, striato-sulcati, pilis recurvis hirti, foliosi, vel in simplices pedunculos divisi, vel racemosi. Pedunculi erecti, patentes, deflexi, undique dense foliosi: foliolis ovato-lanceolatis, obovatis integris, obliquis, deflexis, adpressis basi ciliatis, margine scabris, ad lentem tenui pube obductis; a semunciali longitudine usque ad semipalmarem, uniflori vel in pedicellos subdivisi. Propagines rosaceae, vel foliiferae vel floriferae. Folia caulina et ramea alterna, patentia reflexa, deflexa, obliqua, inferiora (b) caulina maxima, lanceolata, acuminata, sessilia, subserrata: serraturis remotis acutis, (ad lentem apiculatis) margine et superne scabra, cito emarrita; superiora et ramea sensim minora ex elliptico-lanceolata, obliqua, deflexa, parum serrata minusque acuta, margine scabriuscula, superne pubescentia, subtus pallidiora venosa, unico nervo cardinali instructa, sensim basin versus latescente, subpubescente.*

*Calyx communis oblongus imbricatus: squamis arcte adpressis lineari-lanceolatis, margine membranaceis, ad lentem piloso-ciliatis (b), apice*

F

dor-

dorsoque viridibus, hinc inde saepe rubellis, sensim longioribus. Corolla composita radiata: Corollulae hermaphroditae non numerosae in disco. Femineae ligulatae 12-14, in radio.

Propria Hermaphroditis (d) campanulata: limbo quinquefido: laciniis patentibus, ovatis, acutis, rubellis, marginatis ante explicationem dilutioribus flavescentibus, conniventibus, dorso pilosis; tubo gracili, virescente, campanula longiori, pilis longis adperso.

Femineae ligulatae (c) obverse lanceolatae, vix calycis longitudine, patentes, denuum revolutae, apice obtusae subtilissime 2-3 dentatae, candidae, in plicam elevatae, sensim in tubum gracilem sparsim pilosum elongatae.

Stamina Hermaphroditis: Filamenta quinque, capillaria, brevia. Anthera cylindracea, tubulosa, ultra flosculos cum filamentis prominens, fusco-purpurascens, apicibus potissimum, demum ex fusco flavescens, striata.

Pistillum Hermaphroditis: Germen oblongum compressum pilosum. Stylus filiformis. Stigma bifidum: laciniis conniventibus incrassatis purpurascens, pubescentibus.

Fe-

Femineis Germen priori simile. Stylus ultra dimidiam partem semiflosculi assurgens, albes-  
cens, stigmata duo linearia, filiformia, conco-  
lora, dein rubella, striata, erecta, vel conni-  
venti- patentia.

Per. nullum. Calyx immutatus.

Semina —

Pappus capillaris, fere longitudine flosculo-  
rum, ad lentem subciliatus.

Femineis semina —

Receptaculum parvum nudum, scrobiculato-  
favosum.

7 *ASTER thyrsiflorus*. D. Fig. 1.

*Aster thyrsiflorus*, foliis lanceolatis medio  
serratis sessilibus glabris, caule thyrsoides tereti  
glabro, pedunculis unifloris.

*Habitat* in Virginia? *Floret* in horto mense  
octobr.

Radix perennis. Caulis herbaceus, erectus,  
3-5-pedalis, teres, sulcatus, glaber, superne  
strictus pedunculis simplicibus vel ramis ramo-  
sus: alternis gradatim brevioribus, medio lon-  
gissimis, thyrsoides, erectis, striato-sulcatis,

F 2

in-



intra sulcos ad lentem pilosis, uno latere ex virescenti saepe coloratis, vndique foliis alternis, lanceolatis, subserratis vel integris, caulinis similibus vestitis, frequenter floribus terminatis simplicibus, vel rarius in pedicellos subdivisis, incrassatis sub calyce pubescentibus, squamis foliosis in calycem usque continuatis.

Folia caulina et ramea alterna, lanceolata, ovato-lanceolata, patentia, recurva, reflexa, acuminata; sessilia, semiamplexicaulia, utrinque glabra saturate viridia, sed cito decolora, per marginem scabra medio serrata: serraturis oppositis 4-5, remotis, incurvis, acutis, cartilagineis; inferne pallidiora venosa, unico nervo cardinali instructa, sensim basin versus latescente, venis confluentibus fasciato. Pedunculi, rami vel propagines intra axillam macula purpurascente notati.

Calyx communis semiovatus imbricatus: squamis laxis, inferioribus patentibus, lineari lanceolatis, dorso sulcatis viridibus, margine membranaceis basique ciliatis, apice mucronulatis (a), interioribus complanatis angustioribus.

Corolla composita radiata: Corollulae hermaphroditae (c) numerosae in disco. Femineae ligulatae (b) 30-40 in radio. Propria hermaphroditis ex cylindraceo infundibuliformis: limbo quin-

quinquefido erecto connivente, laciniis acutis, impressis concavis marginatis, basi contractis, flavescentibus, demum fusco-purpurascentibus; clausis, apice virescentibus, dorso subciliatis; tubo gracili virescente, flosculo  $\frac{1}{2}$  breviori, 5 lineis percurso.

Femineae ligulatae obverse lanceolatae, patientes, plicato-striatae, luci obversae 4 lineis percurvae, colore incarnato in dilutiorem violaceum et roseum vergente, apice acute bi-tridentatae, in tubum brevem, virescentem, ad lentem pilis adpersum, sensim elongatae.

Stamina Hermaphroditis: Filamenta quinque capillaria, breviter. Anthera cylindracea, tubulosa, ultra flosculos parum eminens, flavescentibus apicibus acutis rubellis, demum fusco-striata.

Pistillum Hermaphroditis: Germen oblongum, subpilosum, striatum. Stylus filiformis vix staminibus longior. Stigma bifidum: laciniis aequalibus acutis conniventibus, lutescentibus, vel rubellis apice, pubescentibus.

Femineis: Germen oblongum, subpilosum, substriatum. Stylus filiformis tubo corollulae duplo longiore. Stigmata duo, linearia, lutescentia, conniventia vel erecto-patientia, apice pubescentia vel glabra.

Per. nullum. Calyx in defloratis squamis laxis patens.

Se.

Semina —

Pappus capillaris, ad lentem subciliatus, longitudine flosculorum.

Femineis semina —

Receptaculum convexum nudum, scrobiculato-favosum.

8. *ASTER Tradescanti*. D. Fig. 2.

*Aster Tradescanti*, foliis ovato-lanceolatis medio serratis, sessilibus glabris, caule paniculato tereti glabro.

*Habitat* in Virginia. *Floret* in horto mense septembri, octobr.

Radix perennis. Caulis herbaceus, erectus, 3-4 pedalis, teres, substriatus, glaber, superne sulcatus, pilis in lineam coordinatis obsitus, flexuosus, ramosus: ramis alternis gradatim brevioribus, paniculatis sparsis, etiam subsecundis, erectis, patentibus, divaricatis, striato-sulcatis, pilosis, uno latere saepe coloratis, undique foliis subaxillaribus vestitis, in pedunculos et pedicellos subdivisis, foliosis: foliis ex ovato-lanceolatis vel lanceolatis integris, subserratis, caulinis similibus. Pedunculi alterni uniflori vel

in

in pedicellos divisi, 2-4 flori, squamis foliosis lineari-lanceolatis vestiti, alternis, sparsis, usque in calycem saepe continuatis; sub calyce modicè incrassati, teretiusculi pilosi.

Folia caulina et ramea alterna, ovato-lanceolata erecta, patentia, obliqua, reflexa, acuminata, radicalia acuta; sessilia, in petiolum membranaceum decurrentia, semiamplexicaulem, margine ciliatum. Utrunque glabra, per marginem medio grosse serrata: serraturis inaequalibus distantibus, acutis, ad lentem apiculatis, scabriusculis; inferne pallidiora, unico nervo cardinali instructa; sensim basin versus latescente, fasciato venis confluentibus.

Calyx communis oblongus, imbricatus: squamis laxè adpressis lineari-lanceolatis (a), margine membranaceis, ciliatis, apice acutis, interioribus purpurascentibus, dorsoque viridibus linea exaratis, immutatis.

Corolla composita radiata: Corollulae hermaphroditae numerosae in disco. Femineae ligulatae 15-20, in radio.

Propria Hermaphroditis (c) ex cylindraceo infundibuliformis: limbo quinquefido erecto  
con-

connivente; laciniis acutis concaviusculis flavescens, demum purpurascens; tubo gracili brevi  $\frac{1}{2}$  fere infundibuli 5 lineis percursum emetiente, virescente.

Femineae ligulatae (b) lineari-lanceolatae patulae concaviusculae, colore ex dilutissimo purpureo in carneum vergente, apice argute bi-tridentatae, 4-lineatae, in tubum brevem sensim elongatae.

Stamina Hermaphroditis: Filamenta quinque capillaria, brevissima. Anthera cylindracea, tubulosa, ultra flosculos prominens, flavescens, striis subfuscis, apicibus acutis dilutioribus saepe coloratis,

Pistillum Hermaphroditis: Germen oblongum. Stylus filiformis, prominens. Stigma bifidum: laciniis incrassatis acutis conniventibus, vel decussatim patentibus, purpurascens, pubescentibus.

Femineis: Germen oblongum. Stylus filiformis longitudine hermaphroditi. Stigmata duo linearia filiformia, obtusa, erecta, furcata, vel conniventia pallide flavescens, glabra.

Per. nullum. Calyx in defloratis, squamis laxis patens.

Se-

Semina hermaphroditis solitaria, oblonga, raro maturescentia subfusca, nitida, 5-6 striata: striis elevatis longitudinalibus pallidioribus. Peripus capillaris (ad lentem subciliatus) seminibus paulo longior, vel flosculorum longitudine.

Femineis semina oblonga prioribus similia.

Receptaculum planiusculum nudum, scrobiculatum punctatum.

*VERONICA virginica* Tab. E. Fig. 1.

*V. virginica*, spicis terminalibus, foliis quaternis quinisque; corollis cylindraceis.

*Habitat* in Virginia et Japonia. *Floret* in horto inde a mense augusto,

Radix perennis. Caulis 4-5-pedalis erectus, strictus, rigidus, teres, superne ad foliorum insertionem obtuse angulosus, pilis rufescentibus ad lentem nodosis pubescens, simplicissimus, superne in spicam simplicem, cui adstant 3 aut 4 laterales verticillatae, terminatus.

Folia plerumque quaterna, raro terna aut quina, patentia, horizontalia, verticillata. In quibusdam suprema alterna, in lateralibus spicis etiam bina, sensim bracteis sub calyce similia.

Ex-

Ex ovato lanceolata, acuta, acuminata, acute et aequaliter serrata: serraturis acutissimis, erectis cartilagineis, non raro incurvis, hinc inde ad lentem quasi duplicato-serratis, ciliatis. Color sordide viridis, subtus tamen pallidior, superficies haud aequabilis, subrugosa potius, hinc inde maculis fuscis adpersa, glabra tamen ad lentem iisdem pilis praesertim pone nervos inferne obsita, nervoso-venosa. Nervus medius satis firmus in petiolum productus brevem, a decurrente folio quasi marginatum, cum vicino confluentem basi, superne canaliculatum. Laterales nervi erecto-patentes margine pone serraturas confluentes. E petiolorum axillis rarius foliola juniora propullulant.

Spicae verticillatae 3-5, simplici vel duplici ordine, erectae, strictae, simplicissimae, lanceolatae, primaria seu caulina maxima, duplo fere longior, citius deflorescens a basi versus apicem, sulcata, eadem fere pube sed densiori ut caulis obducta. Flores candidissimi undique et spiraliter quasi ambiunt pedunculum communem. Pedicelli brevissimi, pilis villosis patentibus tecti, bracteisque instructi subulatis basi amplectentibus pedicellum, fere calycis longitudine, adpressis (c).

Ca-

Calyx Perianthium (a, b, c) quinque-rarius sexfidum, persistens: lacinia infima s. inferiore minima, duabus exterioribus vix reliquis longioribus, omnibus lanceolatis acuminatis, dorso pilosis, margine membranaceis albidis subserrato-ciliatis, interne glabris, nervis pellucidis obsolete percursis.

Corolla monopetala cylindrica (a, b, e) superne angustior, recurva, primum erecta, deinde fere ad horizontem patentiuscula. Limbus quadripartitus, erectus: laciniis ex ovato-cordatis acutis margine inflexis, suprema fere latiori declinata, infimaque angustiore reclinata, lateralibus aequalibus. Color candidus. Longitudo bis terve calycem superans. Pili hinc inde simplicissimi, sparsi. Orificium a pilis, per longitudinem tubi et staminum sparsis, nequiter clausum (e).

Stamina Filamenta duo erecta, divergentia corolla longiora filiformia, tubo inserta, ejusdemque cum pilis horizontalibus colore, quibus praesertim ad latus internum obducuntur (e). Antherae oblongae medio sulcatae, primum erectae, deinde incumbentes recurvae, colore pallido luteo, ochraceo.

Pi-



Pistillum germen (d) oblongum, medio sulcatum, apice pilosum, basi nectario cinctum annulari virescenti. Stylus filiformis erectus, obliquus apice attenuatus, staminibus brevior. Stigma minimum rubellum.

Capsula oblonga (c), acuta tetragona, stylo et pilis persistentibus coronata, virescens, rubella bilocularis, quadrivalvis?

Semina (f) oblonga exasperata, retrusa ad lentem, altera parte convexa; minuta, plurima abortiva.

*VERONICA longifolia.* E. Fig. 2.

*V. longifolia*, spicis terminalibus, foliis ternis quaternis lanceolatis acuminatis, inciso-serratis, utrinque glabris.

*Habitat* in Europa. *Floret* in horto m. Jul.

Radix perennis. Caulis bipedalis et ultra, teres, inferius glaber, superne tomentosus; tomento tenui, pubescentiae simili; erectus, neque strictus, varie saepe flexus, simplex, aut in ramos divisus.

Folia plerumque terna, etiam quaterna, rarius opposita, patentia, deflexa, lanceolata acumi-

minata, neque basi cordata, sed in petiolum cum nervis decurrentia. Margo inciso-serratus; serraturis grossis, acuminatis, inaequalibus, duplicato-serratis, vel simplicibus, apice ad lentem incrassatis, cartilagineis quasi varietate flexis. Superficies utraque, colore pallidiore ex lutescente viridi, quam in consimilibus speciebus, glaberrima, rarius plana, frequenter latere connivens seu conduplicata. Nervus medius subtus prominens, satis firmus, in petiolum productus semipollicarem et longiorem, quem laterales concomitantur 2-3 nervi, ultra inaequalem basin producti, inde folia quasi triplinervia. Petiolus teres, glaber, a marginibus conniventibus ad lentem sparse pilosis, canaliculatus, complicatus, basi marginata confluens cum opposito. Intra axillas eorum foliola juniora et rami frequentius propullulant, quam in ulla alia specie. Spica terminalis simplex 3-6 uncialis oblonga, a basi nempe ad apicem efflorescens, e diluto violaceo caerulea, florum pedicellis undique obsita calyce brevioribus, purpurascens, longiori pube patente quam in *V. maritima* obductis, bractea lineari, calycem longitudine attingente, in flosculis infimis tantum superante, instructis, pubescente. Spicae laterales frequentes oppositae, ternae, verticillatae, saepe ultra medium caulis oriundae, rami potius, foliosi, terminali

cae-

caeterum similes breviores, pedunculo tereti aequae tomentoso, nudo vel folioso.

Calyx Perianthium (a) quadripartitum, persistens: laciniis 2 inferioribus tubo corollae longioribus, erectis, lineari-lanceolatis, acuminatis, apice incurvis, superioribus brevioribus vix latioribus, rariter pilosis, aut denticulatis, basi dilute purpurascente petioli colore.

Corolla monopetala (b) rotata, tubus longitudine fere calycis, angustior, obscure quadrangulus, paulo incurvus. Limbus quadripartitus erectus, patens, laciniis omnibus fere aequalibus, obovatis, obtusis, suprema vix latiore infimaque paulo angustiore. Color saturatior quam in *V. maritima* caerulescens, lineae venosae dilutiores. Orificium angustius, quadrangulum villis convergentibus clausum. Stamina Filamenta duo corolla erecta duplo longiora, erecta, approximata, parum divergunt fere parallele horizontem spectant ejusdemque cum stylo, parum deflexo coloris saturatioris. Antherae oblongae, erectae, saturate caeruleae, dehiscentes incumbunt subcordatae a polline sulphureae.

Pistillum Germen oblongum subcompressum nectario cinctum annulari virescente flexuoso tenu-

nuiore (c). Stylus filiformis strictus, declinatus. Capsula (d) ex oblongo cordata glabra, primum virescens, dein subfusca, turgida, bilocularis quadrivalvis.

Semina (e) exigua, non numerosa, subrotunda, altera parte plana, altera convexa lutescenti-fusca.

*VERONICA crenulata.* E. Fig. 3.

*Veronica crenulata*, spicis terminalibus, caule foliisque pubescentibus oblongo-lanceolatis serratis, calycibus acutis, laciniis corollae crenulatis.

*Habitat* — *Floret* in horto mense augusto.

Radix perennis. Caulis sesquipedalis, bipedalis, erectus, striatus, teres, superne pubescens, simplex, aut in ramos floriferos 3 - 4 - 6 sine ordine divisus.

Folia opposita decussata rarius terna, superiora sensim minora, alterna, erecta, patentia, ex oblongo lanceolata, acuta, subsessilia, vel brevissime petiolata, cuneiformia, infima longius petiolata, canaliculata, margine serrata usque in apicem: serraturis subaequalibus, acutis, lateribus

bus anticis rectis. Apex dentis duplicati magnitudine ac forma, saepe subfuscus, etiam ad serraturas. Superficies pilis sparsis incurvis adpressis, usque in marginem, inferne ad nervos pubescens. Nervus medius satis crassus in petiolum productus brevem, a decurrente folii substantia membranaceum, superne planum, a lateralibus venis 2, inferne comitatum, semiamplexicaulem, et cum opposito tantum in inferioribus foliis hinc inde confluentem. Propagines foliiferae aut floriferae inter axillas, depauperatae, vel nullae, hinc tardius inde erumpentes. Color foliorum neque saturate viridis, subtus tamen pallidior. Spica terminalis vix semipedalis, lanceolata a basi ad apicem sensim efflorescens, saturate et pulchre caerulei coloris, florum pedicellis brevissimis pubescenti-pilosis undique ac dense obsita, bractea calycis longitudine, etiam brevior, in infimis floribus, foliolo lanceolato, calyce longiore instructis, pilosis. Spicae laterales alternae breviores.

Calyx Perianthium (a) quadripartitum persistens: laciniis 2 inferioribus vix longioribus erectis, subincurvis, lanceolatis acutis, basi rubellis, margineque pilosis: pilis longis flexuosis; interne glabriusculis, nervoso-venosis, externe subcanescentibus.

Co-

Corolla monopetala (b) rotata. Tubus longitudine calycis, recurvus cylindricus, basi subangulosus subventricosus (c). Limbus quadripartitus erectus: lacinia inferiore angustiore oblonga patente, superiore obovata obtusa, lateribus complicatis, acuta quasi, undulata crenulata, basi angustata laterales laciniae ex ovato quasi rhomboideae, horizontales vel erectae, per marginem usque in apicem crenulatae, etiam sinuato-dentatae (d). Convergent omnes, colore saturate caeruleo, venis aliquot concoloribus percursorum. Orificium villis convergentibus densis clausum.

Stamina Filamenta duo (in quibusdam floribus, quod alias in Veronicis raris observatur, tria, quatuor) erecta, qua divergentia, fere parallela, laciniis corollae longiora, ejusdemque cum stylo laciniae infimae incumbente, deflexo, producto, colore caeruleo. Antherae oblongae erectae saturatius coloratae, medio sulcatae, dehiscentes, incumbentes, recurvae, polline flavae, pallidae.

Pistillum Germen (e) oblongum subcompressum pallide virescens, superne pilis aliquot 2 3 adpersum, etiam in maturescentibus capsulis ad lentem hinc inde conspicuis. Nectarium viride

G

or.

orbiculare. Stylus filiformis recurvus, staminum demum longitudine, basi vix angustior.

Capsula ex ovato subrotunda (f) apice margineque compressiuscula, glabra, stylo flexuoso, deflexo coronata; quadrivalvis, bilocularis.

Semina numerosa (g), purpurascenti-fusca subtilissime reticulata, oblonga, altero latere plana, altero convexa.

*VERONICA complicata.* E. Fig. 4.

V. complicata, spicis terminalibus, lateralibus brevioribus subnutantibus, foliis oppositis complicatis dentatis: dentibus incrassatis, laciniis corollae integerrimis.

*Habitat* in Europa. *Floret* in horto inde a mense augusto.

Radix perennis. Caulis bipedalis, erectus, subflexuosus, teres, inferne glaber, superne pubescens, hinc inde ex viridi purpurascens, in spicas terminatus frequenter oppositas, brachiatas, quarum laterales terminali breviores nantes.

Fo-

Folia plerumque opposita, rarius terna, erecta, patentia, reflexa, lineari-lanceolata, radicalia vel primordialia magis elliptica vel oblonga, subincana, pubescentia; sensim bracteis similia, acuta, grosse crenato-dentata: dentibus incrassatis inaequalibus rectis, apice ad lentem subfuscis. Color sordide, tamen saturate viridis, subtus pallidior. Superficies aequabilis, neque plana sed plus minusve lateribus conniventibus complicata, conduplicata, nudo oculo glabra, ad lentem sparsis pilis superne et ad nervos pubescens. Nervus medius satis firmus in petiolum productus uncialem circiter, a decurrentibus lateralibus nervis et foliorum laminis quasi marginatum, superne canaliculatum, cum vicino confluentem. Laterales nervi ad angulum acutum oriundi pone serraturas confluent et intra satis crassam foliorum substantiam evanescent. E petiolorum axillis propagines foliosae depauperatae propululant.

Spicae oppositae, decussatae, raro verticillatae aut alternae, simplicissimae, virgatae; terminalis seu caulina reliquis longior erectior, citius deflorescens a basi versus apicem, inter breves pedicellos subangulosae, densiori pube obductae. Flores caerulei dense ambientes pedunculum communem. Pedicelli brevissimi bracteisque in-



structi lineari - lanceolatis calyce primum longioribus, dein subaequantibus vel brevioribus illum maturescente capsula. - Pili ad lentem brevissimi, incurvi, adpressi.

Calyx Perianthium oblongum quadrifidum persistens: laciniis inferioribus parum longioribus, oblongo - lanceolatis, superioribus 2 latioribus, ex ovato fere lanceolatis, virescentibus, exterius brevi incurva margine exstante pube obductis, interius ad lentem venis subtilissimis tribus percursis.

Corolla monopetala rotata (b), tubus cylindricus laciniis brevior subangulosus rectus, vel parum incurvus, calyce paulo longior (c). Limbus quadripartitus erecto - patens: suprema lacinia ovata latissima, integerrima, infima angustiore ovato - lanceolata, lateralibus binis oblongis distantibus. Omnes venosis lineis percursae. Orificium villis conniventibus clausum.

Stamina Filamenta duo, stricta, divergentia, corolla longiora, ejusdemque cum stylo coloris. Antherae ovatae erectae ex albido vel pallide caeruleae, dehiscentes cordatae incumbentes, lutescentes.

Pistil-

Pistillum Germen ovatum pallide virescens, nectario virescente cinctum. Stylus filiformis declinatus, superne incrassatus, saturatiori colore caeruleo tinctus.

Capsula obcordata (d) glabra, primum virescens, dein purpurascens, stylo coronata, dehiscentis margine acuto bilocularis quadrivalvis.

Semina plurima ovata, altera parte plana, altera subconvexa lutescenti fusca, ad lentem angulosa.

## VI.

Ueber Linné's

**Antirrhinum Peloria**

von

D. G. Kieser.

Keine Warnung ist wohl in der Botanik wichtiger, und dennoch öfter vernachlässigt worden, als die, sich zu hüten, daß man nicht Anomalien in dem Baue der Pflanzen, selbst wenn sie in mehreren Individuen übereinstimmend sind, für Charactere einer neuen Gattung halte, und Monstrositäten neue Namen gebe. Einen auffallenden Beleg hierzu giebt das *Antirrhinum Peloria*, das auch deswegen vor andern Spielarten merkwürdig ist, weil die erste Erscheinung derselben so grosse Sensation erregte, und man so lange ungewiß war, ob man es bloß für eine vergängliche Ab-

Abweichung von der gewöhnlichen Gestalt halten, oder als eine fruchtbare Bastardpflanze zweier verschiedenen Blumen, also als eine neue Gattung dem Pflanzenregister beifügen sollte. Durch einen glücklichen Zufall ist mir ein Exemplar des gewöhnlichen Antirrhinum Linaria, aus dem *botanischen Garten in Göttingen*, in die Hände gekommen, an welchem *eine* Blume von der Gestalt der Peloria, die übrigen aber von dem gewöhnlichen Baue des Antirrh. Linaria befindlich sind. Durch dieses Exemplar habe ich also den augenscheinlichsten Beweis in Händen, daß die Peloria Linné's nur eine *widernatürliche Bildung*, (*fabrica aliena, degeneratio*) der Blumen des Antirrhinum Linaria, und keinesweges eine dieselbe Blume wieder hervorbringende Bastardpflanze von zwey verschiedenen Gattungen sey.

Da, so viel mir bekannt, Exemplare des Antirrh. Linaria, an welchen zugleich diese Peloria befindlich ist, äusserst selten gefunden werden und nur Sowerby (*Engl. bot. t. 653*) eines solchen erwähnt, so wird es jedem ächten Botaniker nicht unangenehm seyn, hier eine gedrängte Geschichte und ausführliche Beschreibung dieser Pflanze zu finden, die genau mit der Natur übereinstimmt, und auch den Abbildungen derselben in *CURTIS flor. Lond. fasc. VI. t. 41.*  
und

und *Sowerby's English bot. t. 260*, die vielleicht manchem der Leser dieser Blätter nicht zur Hand sind, im generischen Character völlig entspricht.

Die erste Nachricht von der *Peloria* findet sich in *Linne's Amoen. Academ. I. p. 55, t. 3.* wo die Pflanze in einer Inaugural-dissertation; "*de Peloria Upsaliae 1744*", von *Rudberg* unter *Linne's* Vorsitz vertheidigt, als eine neue aus verschiedenen Gattungen entstehende Bastardpflanze weidläufig beschrieben und abgebildet ist. Die Pflanze wurde von *Zioeberg* in Schweden im Jahre 1742 gefunden; der bekannte Botaniker und Sprachkenner *Olaus Celsius* sah sie in *Zioeberg's* Herbarium, und zeigte sie *Linne*, der sie zuerst für eine Pflanze des *Antirrh.* *Linaria* an der die wahren Blumen abgepflückt und Blumen einer ausländischen Pflanze an deren Stelle gesteckt wären, hielt, aber bey genauerer Betrachtung bald vom Gegentheile überzeugt wurde. *Linne* selbst erklärte sie nun für eine Bastarderzeugung zweyer verschiedener Pflanzen \*), und es fehlte ihm

\*) *Peloria*, *Linariae* proles hybrida ejusdemque qualitatis et constans, radicibus infinite sese multiplicans, caractere fructificationis diversissima: Corolla regulari, quinquicorni, culata, pentandra, ut genus proprium absolute constitueret,

ihm nur noch der fruchtbare dieselbe Gattung hervorbringende Same, um sie als eine neue Pflanze im Systeme aufzuführen. Er nannte sie indessen *Peloria*, von dem griechischen Worte *πελωρ* monstrum, so wie Apollonius Rhodius eine Mißgeburt *πελωρ τεκος* nennt.

So weit Linne's Beobachtung. — Seinen Schülern und den übrigen Botanikern war es vorbehalten durch Versuche zu erfahren, ob die *Peloria* auch fruchtbaren dieselbe Gattung hervorbringenden Samen trüge, ob also der Character dieser Blume beständig sey, und sie selbst für eine fruchtbare Bastardpflanze oder für eine neue Gattung müsse angesehen werden, welches bis dahin den schwedischen Botanikern nicht hatte gelingen wollen.

Man

et distinctissimum, nisi fructus semper abortit. *Naturae prodigium.* Nach einer Stelle in Hrn. Hofr. Beckmann's *Lexicon botanicum*, p. 167, die ich hier wörtlich anführen will, mußte später in Linné den Irrthum seiner vorgefaßten Meinung gefühlt haben. Neque Linnaeus, quo tempore mihi contigebat (sagt Hr. Hofr. Beckmann) ejus familiaritate frui, non sciebat sese errasse. Erat ei jam tunc memoria Pelorae adeo molesta, ut sedulo caverem, ne ejus recordatione senem venerabilem offenderem.

Man sah die Pflanze zwar schon 1746 in Deutschland, wie Haller irgendwo anführt, aber ohne auf sie solche Rücksicht zu nehmen, welche diesen Streit hätte entscheiden können. Wie also Leighton im Jahr 1792 dieselbige Pflanze auch in England wild wachsend fand, erneuerte man die Versuche, aber immer ohne fruchtbaren Samen zu erhalten, und man zog die Pflanze einige Jahre hindurch mittelst Wurzelableger in Töpfen. Man nahm indessen die Pflanze als eine Varietät in mehreren botanischen Werken \*) auf, und liefs die wahre Bestimmung derselben noch zweifelhaft. Vor einigen Jahren gelang es endlich dem Professor Hoffmann reifen Samen der Peloria im botanischen Garten zu Göttingen (wo sie wie ähnliche Monstrositäten durch die Wurzel vermehrt und sonst auch um Göttingen nicht selten wild wachsend gefunden wurde, ohne auf derselben Wurzel sich in *A. Linaria* umzuwandeln)

\*) *Willd. Spec. pl. III, p. 254.* Peloria est singularis progenies *A. Linariae*, radices enim ejus solo sterili plantatae, degenerant in *Linariam*, sed semina Peloriae solo pingui sata faciem plantae conservant (?).

*Sowerby engl. bot. t. 260.*

*Smith flor. brit. Vol. II, p. 660.*

*Withering bot. arrangement of the brit. pl. Vol. II. p. 648.*

deln) zu erhalten \*), und Versuche über die Fortpflanzung derselben anzustellen, die sehr glücklich ausfielen, und bewiesen, daß der Same der *Peloria* zwar fruchtbar sey, aber nicht wieder *Peloria*, sondern *Antirrhinum Linaria* gebe; daß der Character der *Peloria* also keinesweges mehrere Generationen durch beständig und eine fruchtbare Bastarderzeugung sey.

Der generische Character der *Peloria*, wie ihn Rudberg in der oben angeführten Dissertation angiebt, und womit die Blume, die ich vor mir habe, einige kleine Abweichungen, die ich nachher anzeigen werde, abgerechnet, übereinstimmt, ist folgender:

*Calyx Perianthium* monophyllum, quinquepartitum, aequale, brevissimum, persistens.

*Corolla* monopetala, infundibuliformis, ad basin nectariis quinque instructa.

*Tubus* subcylindricus, parum ventricosus, longus, rectus.

*Limbus* patens, quinquepartitus, obtusus, aequalis.

*Nectaria* quinque, subulata, colorata, corniculata, plana, patentia, in orbem a tubo supra basin enata.

*Sta-*

\*) *Usteri Annalen d. Bot. St. 13. p. 90.*



*Stamina Filamenta* quinque capillaria, aequalia, tubo corollae dimidio breviora, receptaculo inserta.

*Antherae* subrotundae, incumbentes.

*Pistillum Germen* ovatum.

*Stylus* filiformis, longitudine staminum.

*Stigma* crassiusculum, obtusum.

*Pericarpium Capsula* ovata, bilocularis, bivalvis, receptaculis convexis, dissepimento adnatis.

*Semina* plurima, angulata.

Von diesem Character weicht mein Exemplar bloß darin ab, daß anstatt fünf Sporen nur viere, und so auch nur vier Staubfäden da sind; doch sind zwey Staubfäden noch länger, als die beiden andern, zum Beweise, daß die Verwandlung des Antirrh Linaria in die Peloria, wenn ich es so nennen darf, noch nicht ihre Vollkommenheit erreicht habe. Auch ist der Limbus noch nicht völlig ausgebildet und fünftheilig. In der oben angeführten Figur des Hrn. Sowerby zeigen sich nur drei unvollkommene Sporne und der Limbus erscheint ohne alle reguläre Bildung.

Aus

Aus allen diesen erhellt also deutlich, daß die Peloria nicht eine Bastarderzeugung, z. E. der *Gentiana* und des *Antirrhinum Linaria*, vielweniger eine neue Pflanze sey. Merkwürdig bleibt es aber dennoch, daß der Bildungstrieb, oder wie wir die bildende Ursache sonst nennen wollen, immer dieselbe monströse Gestalt der Peloria selbst bey ganz verschiedenen Gattungen hervorbringe \*), und also auch selbst noch in seiner Abweichung gewissen Gesetzen folge, daß er die Blumen nur halb verwandelt, wenn er nicht in seiner ganzen Kraft wirken kann, hingegen alle Blumen an einer Pflanze vollkommen in die Peloria umbildet, wenn seiner Kraft nichts entgegen steht.

\*) Z. E. bey *Antirrhinum spurium*, *Elatine* und *Cymbalaria*, ferner bey *Dracocephalum austriacum* und *Antirrhinum triphyllum*, vide Schmidt Sammlung physikal. oecon. Aufs. I. p. 14. t. 2.

Mehrere Beispiele sind angeführt in Link Annalen d. Naturgesch. I. p. 32. und von Merk in Gött. gel. Anz. 1774. n. 121.

## VII.

## Satyrium Epipogium Lin.

## Tab. I.

Man kennt bereits aus einem sehr lesenswerthen Aufsatz des Hrn. *Wächters* \*) über die merkwürdige Ortsveränderung der Antheren bey den Orchideen, die besondere Einrichtung, welche die Natur zu ihrer Befruchtung getroffen hat. Bey allen haben die Geschlechtstheile eine solche Lage gegeneinander, daß es den männlichen durchaus unmöglich wird, die Befruchtung der weiblichen zu verrichten, wenn sie nicht aus ihrem natürlichen Standort heraus, und in die Sphäre der weiblichen Theile versetzt werden. Die Natur

\*) *Römers Archiv für die Botanik* 1ten B. 2tes St. S. 209-215.

tur bedient sich zu diesem Ende zweier Hülfsmittel: erstlich einer klebrigen Feuchtigkeit, welche sie entweder bey den Antheren, oder in deren Nachbarschaft an andern Theilen der Blume angebracht hat, und zweitens der Insecten, oder anderer äusserer Zufälle, um sowohl die Verbindung der Antheren mit der klebrigen Feuchtigkeit zu befördern, als auch, wenn dieses bereits geschehen, die Antheren nach einem andern, der Befruchtung günstigeren Ort zu bringen. Jene klebrige Feuchtigkeit ist auf eine dreifache Weise angebracht:

in einem besondern, zwischen dem Antherenträger und der Narbe liegenden Saftblättchen — Ophrys —

auf einem über die weibliche Narbe hervorragenden Rande — Serapias — und

an dem Fusse der Antheren oder Staubkölbchen selbst — Satyrium — Orchis —

Lezteres ist auch der Fall bey Satyrium Epipogium, welches die Wißbegierde und Aufmerksamkeit der Botaniker noch gar nicht auf sich gezogen hat, und wahrscheinlich wegen seiner grössern Seltenheit, in wenigen Gegenden Deutschlands, unter dem ihm an Farbe so ähnlichen Laub der Bäume aufgesucht worden ist. Die ein-

einzige vorzügliche Zeichnung von der ganzen Pflanze findet man in *Jacquin's Flor. austr.*, aber ohne alle einzelne Darstellung der Geschlechtstheile. Gegenwärtige nach der Natur gezeichnete und um Göttingen nicht selten wachsende Pflanze stellt dieselbe mit ihrem Pflanzenkörper und einigen jungen noch nicht völlig entwickelten Seitensprossen in natürlicher Farbe und Gröse vor. a. Die Blume von vorne betrachtet, b. die Fructificationssäule abgesondert davon. c. Die Blume von der Seite nach Wegnahme des obern Honigblatts und den Antherenträger aus seiner Lage vermittelt seiner eigenen leichten Beweglichkeit herabgezogen. Es scheint eine Art von Articulation hier Statt zu finden und dazu bey *Serapias* der Uebergang angebracht zu seyn, wo der Antherenträger vermittelt zweier kleiner Fortsätze auf der Fructificationssäule eingelenkt und etwas beweglich ist. (Wächter a. a. O. t. 16. Fig. 18.). Hier ist noch besonders merkwürdig das leichte Zurückspringen des Antherenträgers in seine vorige Lage, eine eigene Concavität an der Spitze der Fructificationssäule, in welcher die Staubkölbchen völlig eingeschlossen und unsichtbar sind — und zweitens die Verbindung der Staubkölbchen mit dem Antherenträger vermittelt zweier Fäden an einem dreieckigten klebrigen Fuß, welcher an der Fructificationssäule

tionssäule befestiget und nur mit einiger Gewalt davon zu trennen ist. Fig. e zeigt noch wie einer der weissen elastischen Fäden an dem Staubkölbchen innerhalb dem Staubträger und dem dreieckigten Fuß befestiget ist. — Die Auflösung des Geheimnisses, auf welche Art die so verborgenen Staubkölbchen zur Narbe gebracht werden und wie die Befruchtung vor sich gehen könne, wird nun einem aufmerksamen Beobachter nicht schwer zu enträthseln seyn. Der Abbildung folgt aber hier noch die Beschreibung der Pflanze selbst in der botanischen Kunstsprache.

*Satyrion Epipogium*, bulbis compressis dentatis, caule vaginato; nectarii labio resupinato indiviso L. *Jacq. austr. t. 84.*

\*) *Limodorum Epipogium*, aphyllum, scapo vaginato paucifloro, floribus pendulis resupinatis, labello trilobo concavo, cornu adscendente ovato Swartz in nov. Act. ups. V. p. 65. Corolla patente (licet resupinata) et columna Limodori proximum l. c.

*Ba*

\*) *Char. Gen.* Petala 5, subpatentia,

*Labellum* basi antice in cornu liberum productum,

*Anthera* terminalis,

H

*Radix* ramosa carnosae compressae ex fusco al-  
bida, caespitose aggregata, partim connata, extremi-  
tatibus palmatis: laciniis rotundatis inaequalibus,  
partim turionibus hinc inde adscendentibus pro-  
ximo anno in scapos elongandis.

*Scapi* teneri pellucidi, inferne bulbosi sensim de-  
crescentes, spathis iam a radice oriundis per inter-  
valla vestiti, membranaceis amplexicaulibus vagi-  
nantibus, ovatis, truncatis, ad lentem pellucidis  
reticulatis, pallide fuscis; ceterum teretes simpli-  
cissimi erecti, extus sordide è flavescenti colore  
albidi, fibris abbreviatis longitudinalibus purpu-  
rascentibus percursi, intus spongiosi solidi vel  
fistulosi.

*Spathae* florales ovatae sub floris cuiusque pe-  
dunculo, membranaceae scariosae, dilute fuscae,  
etiam albidae, concaviusculae, nervosae pelluci-  
dae reticulatae, supremae lanceolatae.

*Pedunculi* breves compressiusculi, in germen  
sensim dilatati, recurvi.

*Flores* speciosi versicolores penduli subsequen-  
di, inversi: labio et cornu nectarii sursum di-  
rectis.

*Petala* 5, duo exteriora lineari-lanceolata,  
duo interiora latiora paulo et longiora, quintum  
et

et intermedium petalum fere lineare et brevius, omnia patentia concava, antrorsum et deorsum porrecta, flavescentia, longitudinalibus punctis dilute purpureis margine et per mediam laminam exasperata (a).

*Nectarii* cornu adscendens superne obtusum inflatum, dilatatum et levi perineo distinctum, confluentibus aquose et dilute purpureis lineis percursum, longitudine fere labii reclinati concavi, cordati acuti, intus excavati lineisque fimbriato-carnosis abruptis (5-6) ex apice descendentes inque aperturam scroti fere exporrectis, dilute purpureis erosi, extus convexi cucullati ad latera in duas lacinias per scrotum excurrentes semiovatas producti,

*Columna fructificationis* s. genitalium (b) declinata, medio depressa glutinosa sellae equinae in modum postice germen versus adscendens iterumque depressa, ubi denique intra germen aperitur; anterieus quasi praeputium retracto albido gelatinoso, frenulo glandem mobilem adfigens. Haec extra situm (c) ovata duobus filamentis tenerrimis adfigitur corpusculo seu frenulo, eiusque ope contractilitate quadam, in priorem situm cuculli in modum excavati, retrahitur. Filamenta ad utramque finem tenuiora, adfiguntur convexae parti antherarum, ex nudo polline

H 2

com.



compositarum, bivalvium (e) quae intra propria loculamenta (d) glandis continentur.

*Germen* ex subrotundo ovatum obtuse trigonum, superne magis complanatum, fluibus lineis continuis obsolete purpureis, interpositis aliis fere contiguis punctis, inferne convexum in quolibet latere duabus lineis, interiectis punctatis aliis obsolete purpureis, inscriptum.

*Capsula* ex subrotundo ovata et obtuse trigona, latere altero reliquis duplo latiore, semina includit numerosa et minutissima ad lentem subrotunda e reticulo membranaceo composita.

## VIII.

## Equisetum pratense Ehrh.

Tab. 2, Fig. 1.

CRYPTOGAMIA *Peltata*.

*Char. gen.* Spica ovata. Fructificationes (Thalamus florum) peltatae, (d) inferne dehiscentes 4 - 7 loculares (Perigonio simplici). Antherae 4, in duorum filamentorum extremitate, (e) Stigma apiculatum simplex (e). Sporangium 8, capsula folliculiformis, olim perigonium constituens 4 - locularis, a latere interiore longitudinaliter dehiscent (d), continens semina numerosa, staminum filamentis imposita.

*Char. spec.* Caule spicato, striato - sulcato, scaberrimo; ramis simplicibus 4 - gonis.

*Syn.* Equisetum pratense. *Ehrh. Beltr. 3. S. 77. Flor. germ. 2. p. 3.*

*Ehrhart* sagt am angeführten Orte: bey Stiege, im Fürstenthum Blankenburg, fand ich auf den Wiesen ein besonderes Equisetum, das fast wie eine

eine neue Species aussiehet. Ich will es hier *Equisetum pratense* heißen, und seine Kennzeichen angeben. *Caules subaequales, ramosi, fistulosi, sulcati, scaberrimi, subvirides. Rami subsenideni, simplices quadrisulcati, patentissimi, steriles. Dentes vaginarum subulati, scariosi, acutissimi: vaginularum quaterni, dorso minime sulcati.* — *Affinis E. arvensi; sed fructificationem in fonde ramosa habet. Ab E. palustri Linn. et E. Heleochari Ehrh. (E. fluviatile et limosum L.) valde diversum. Ich empfehle es seinen Landsleuten zur weitem Untersuchung.*

Die Beschreibung von diesem *Equisetum*, nach denen von Ehrhart selbst gesammelten Exemplaren wäre in der Kunstsprache kürzlich folgende.

*Caulis palmaris aut dodrantalis, erectus vel subincurvus, spica terminatus, crassitie (in exsiccatis) culmi triticei, superne sensim attenuatus: striato-sulcatus scaberrimus; striis 10-12 elevatis, ad lentem minutis et horizontaliter directis denticulis armatus. Internodia uncialia, 10-18, inferne nuda. Rami verticillati patentissimi 5-14, semunciales, unciales, steriles, simplicissimi, lineares, tetragoni, quadrisulcati, pallide virides, basi squamulis subfuscis vaginati, e vaginulis 5-6 compositi, quadridentatis: den-*  
ti-

tibus brevissimis acutis, erectis vel conniventibus margine subfuscis membranaceis; glaberrimis, hinc inde scabriusculis. Vaginae caulibus sursum dilatatae, sulcato-striatae: striis elevatis obtusis, linea exaratis, viridescentes. Dentes vaginarum 10-14, membranacei, scariosi, subulati, acutissimi, basi subfusci, medio striati (c). Spica terminalis oblonga, erecta (a) vel recurva (b), pedunculata, basi annulo membranaceo cincta (in siccis exemplaribus plicatulo) colore pallido, apice fusca vel tota fusca. Peltae more generis angulosae plerumque hexagonae, conniventes vel inter se distantes, verticillatae, pedicellatae, in loculamenta 6-7 dehiscentes (d).

Vergleicht man damit ein *Equisetum pratense*, welches Hr. Dr. Roth, unter diesem Namen, in dem dritten Theil seiner Flora german. (S. 7.) sehr gut beschrieben und um Erlangen gesammelt erhalten hat, so ergeben sich nach denen mit dem Ehrhartischen verglichenen Exemplaren folgende Verschiedenheiten. Der Stengel anderthalb bis zwei Fufs hoch, weniger rauh; dagegen die Aeste beinahe alle unter der Lupe, (und auch dem Gefühle nach) an ihrer scharfen Kante mit kleinen Zähnen besetzt und durchsichtig queerstreifig; nicht allein vierseitig, sondern beinahe vierflügelig, eine Spänne  
und

und darüber lang, einfach, oder auch hier und da in zwei und mehrere wirbelförmig stehende Nebenäste vertheilt. Die Scheiden woraus die Aeste zusammengesetzt sind haben einen grünen scharfen Rücken, vier lange auswärtsgebogene zugespitzte Zähne. Die Scheiden des Stengels erweitern sich zwar auch nach oben, aber sie sind kürzer, ihre Zähne mehr an der Spitze als Basis braun. Die Aehre fehlt gänzlich. Ob nun, wenn diese abfällt (wovon aber durchaus keine Spur zu sehen ist) mit dem Stengel eine solche Veränderung vorgehet, oder ob-ausser den Aehrenbringenden, noch andere sterile Individuen neben jenen hervorkommen, darüber müssen erst mehrere Beobachtungen Aufklärung geben. Merkwürdig ist diejenige des Hrn. Dr. Delavigne, daß er zu keiner Jahreszeit neben diesen langästigen sterilen Individuen fruchtbringende um Erlangen finden konnte. Auch verhält es sich auf gleiche Art mit solchen Exemplaren die im Hannöverischen gesammelt worden sind.

Mit dem *E. arvense* verglichen zeigt sich darin-  
 nen wenigstens einige Verschiedenheit, daß die  
 Aeste viel länger als an jenem sind (der Nahme  
*E. caudatum* oder *elongatum* wäre nicht unpas-  
 slich dafür) ihre Scheiden fest anschliessend und  
 gleich-

gleichbreit, die 4 Zähne mehr abgebogen, dagegen bei *E. arvense* die kleinern Scheiden nach oben sich erweitern und gewöhnlich mit 5 langen Zähnen und eben so vielen scharfen Kanten versehen sind. Die gezähnelte Oberfläche findet sich bei dieser und auch bei mehreren andern Arten.

---

## IX.

Vorläufige Nachricht  
 die Befruchtungswerkzeuge  
 der  
 F a r n k r ä u t e r  
 betreffend  
 von  
 Kurt Sprengel  
 Professor zu Halle.  
 Tab. 2. Fig. 2.

Es ist bekannt, wie verschieden die Meinungen über die Antheren der Farrenkräuter bis jetzt waren, und wie wenig Gewissheit selbst Hedwigs Beobachtungen über diesen Gegenstand hatten. Er gab theils der Meinung des *Micheli*, theils der Schmidel'schen Idee Beyfall. Nach jener sollten die gestielten Kügelchen oder Haadrüsen  
 in

in den jungen Trieben der Farnkräuter, nach dieser die braunen Harzdrüsen in dem Polyp-  
 Thelypteris die Stelle der Antheren vertreten.  
 (Hedw/ Theoria generat. et fructificat. plant. cryptogam. Tab. V. VI. VII.). Diese Meinungen waren eben so wenig wahrscheinlich als die Kölreuter'sche, daß die Hüllen der Saamenkapseln das befruchtende Princip enthalten. Am meisten gefiel mir sonst immer Hill's Behauptung, der gegliederte Ring der Saamenkapseln verrichte das Geschäft der Befruchtung. Indessen stand auch dieser die Analogie entgegen. Ich gieng bey meinen Untersuchungen von der Idee aus, daß die Antheren nur unter dem Involucrum, ehe die Kapseln reif geworden sey, zu suchen seyen. Ich zergliederte demnach mehrere Farnkräuter, noch ehe sich die Hüllen erhoben, wenn sie sich kaum zu bilden angefangen hatten, und da fand ich bey der *Pteris cretica*, wie bey den Asplenien zwischen den gestielten Ovarien (Fig. c. b. b. b. b.) durchsichtige Kölbchen oder den Paraphysen der Moosblüthen ähnliche Theile (a. a. a. a. a.) die eine deutlich zu bemerkende Bewegung gegen die Ovarien zeigten und nachher verwelkten wenn sie sich den Ovarien genähert hatten. Sollten dies nicht die Antheren seyn? — Meine Beobachtungen sind noch



noch nicht so zahlreich, daß ich sie zur Würde der Erfahrung erhöhen dürfte. Aber Aufmerksamkeit verdient dennoch dieser Gegenstand. Von der elastischen Bewegung der Körperchen habe ich mehrere Zeugen, unter andern den geschickten Künstler A. G. Eberhard.

---

F. 2.



F. 1.

A





B

F. 1.



F. 2.



a



Cornell  
University  
Library



F. 2.



F. 1.

C





D

F. 1.

F. 2.





















Camellia







*Helmsfieldia sanguinea* original from  
 Digitized by Google CORNELL UNIVERSITY











